

難防除病害

ネクロティックリングスポット病に!



低温期病害

イエローパッチに適用拡大!



「ひとつ」でも使える。「いろいろ」使える。  
年間を通じて芝草病害防除に活躍します。

農林水産省登録  
第22211号

規格:250g×6袋



日本芝・西洋芝の病害を幅広く防除する総合殺菌剤

**ガイア<sup>®</sup>**顆粒水和剤



フェアリーリング病



葉腐病(ブラウンパッチ)



葉腐病(ラージパッチ)



ダラースポット病



雪腐小粒菌核病

ガイアは三井化学アグロ(株)の登録商標



三井化学 株式会社 エムシー緑化  
グループ

## 特長

- 1. 幅広い病害スペクトラムを有する。** 本剤はダラースポット病、フェアリーリング病、炭疽病、葉腐病(ブラウンパッチ、ラージパッチ)、雪腐小粒菌核病、疑似葉腐病(春はげ症、イエローパッチ)、カーブラリア葉枯病(犬の足跡)、さび病、ネクロティックリングスポット病、デッドスポット病等の幅広い病害に優れた効果を示します。
- 2. 既存薬剤耐性菌に有効。** 本剤は、既存のベンズイミダゾール系殺菌剤、ストロビルリン系殺菌剤及びEBI剤とは異なる作用機作を有する新規系統成分・ベンチオピラドを含む殺菌剤です。
- 3. 予防効果に優れる。** 分生胞子の発芽阻害に優れるため、発病前から発病初期の予防的散布が効果的です。胞子形成阻害作用が強く、二次感染の防止や、菌糸伸長阻害作用による治療効果も期待できます。

## 適用病害と使用方法

(2015年11月11日付拡大登録内容を含む)

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベンチオピラドを含む農薬の総使用回数			
西洋芝 (パームユーダグラス)	ダラースポット病	2000倍	0.5ℓ/㎡	発病初期	8回以内	散布	8回以内			
西洋芝 (ペントグラス)		400倍	0.1ℓ/㎡							
西洋芝 (ライグラス)		2000倍	0.5ℓ/㎡							
西洋芝 (ブルーグラス)		400倍	0.1ℓ/㎡							
日本芝		2000倍	0.5ℓ/㎡	根雪前						
		400倍	0.1ℓ/㎡							
		2000倍	0.5ℓ/㎡							
		2000倍	0.25ℓ/㎡	休眠期前						
		2000倍	0.25~0.5ℓ/㎡	発病初期						
		2000倍	0.5ℓ/㎡	秋~春期						

## 使用上の注意事項

### △ 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 敷布液調製後はできるだけ速やかに散布してください。
- 敷布液調製の際は、水をかきませながら本剤の所定量を徐々に加えてください。
- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用は避け、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用してください。
- 蜂に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかかるないようにしてください。
- 本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

○ 使用前にはラベルをよく読んでください。○ ラベルの記載以外には使用しないでください。○ 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。  
○ 容器・空袋などは圃場などに放置せず、適切に処理してください。○ 防除日誌を記帳しましょう。

\*本製品は芝用殺菌剤であり、製品ラベルの記載内容以外には使用しないでください。

\*本印刷物は2016年4月末日現在の資料、情報、データ等に基づいて作成していますが、記載データ及び評価はあくまでも測定値の代表例であり、全ての事例に当てはまるものではありません。

### △ 安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して刺激性があるので、散布液調製時及び散布の際は保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。



三井化学  
グループ 株式会社 エムシー緑化

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-7-7  
TEL 03-6842-8590 FAX 03-6842-8593  
ホームページ <http://www.mc-ryokka.com/>