



# PRICE LIST

# 2026

## 価格表

ゴルフ場管理資材のことなら  
株式会社 マイスター

# INDEX

年間施肥計画（ベントグリーン）・・・02P

年間計画（殺菌剤・殺虫剤・施肥 他）・・・04P

液肥、粉末液肥、リン酸資材、UVカット剤・・・06P

腐植酸資材、アミノ酸資材、微量元素資材・・・07P

ケイ酸資材、活性剤、鉄資材、微生物資材、分解資材・・・08P

グリーン用微生物資材、粒状肥料・・・09P

ICL社スペシャリティー肥料 他（旧スコツツ品）・・・10P

融雪剤、浸透剤、着色剤・・・12P

池浄化剤、展着剤、その他・・・13P

除草剤・・・14P

殺菌剤・・・20P

殺虫剤・・・26P

樹木用殺虫剤、マツクイムシ防除用樹幹注入剤、植物成長調整剤・・・30P

芝生種子、ソッド・・・32P

化成品・・・35P

各種請負業務・・・36P

薬量と散布面積表、希釈倍数表・・・39P

年間施肥計画（ベントグリーン）

| 品 目          | 分 類             | 肥 料 成 分 |      |     |      |      |      |      |      |     |       | 1 月 |    |    | 2 月 |    |    | 3 月 |    |    | 4 月 |    |    | 5 月 |    |    | 6 月 |    |    | 7 月 |    |    | 8 月 |    |    | 9 月 |    |    | 10 月 |    |    | 11 月 |  |       | 12 月  |       |  | ㎡ 合計 |
|--------------|-----------------|---------|------|-----|------|------|------|------|------|-----|-------|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|------|----|----|------|--|-------|-------|-------|--|------|
|              |                 | N       | P    | K   | Ca   | Mg   | B    | Fe   | Mn   | Zn  | Si    | 上旬  | 中旬 | 下旬 | 上旬  | 中旬 | 下旬 | 上旬  | 中旬 | 下旬 | 上旬  | 中旬 | 下旬 | 上旬  | 中旬 | 下旬 | 上旬  | 中旬 | 下旬 | 上旬  | 中旬 | 下旬 | 上旬  | 中旬 | 下旬 | 上旬  | 中旬 | 下旬 | 上旬   | 中旬 | 下旬 |      |  |       |       |       |  |      |
| 芝太郎 1 号細粒    | 菌体入り有機化成        | 6       | 7    | 6   |      | 2    |      |      |      |     |       |     |    |    |     |    |    | 50  |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     | 50 |    |     |    |    |      |    |    |      |  | 100 g |       |       |  |      |
| 総合ミネラル宝素(細粒) | 土壌改良剤           |         | 0.7  | 2.9 | 2    | 2.67 |      | 6.37 | 0.22 |     | 58.15 |     |    |    |     |    |    |     | 50 |    |     |    | 50 |     |    |    | 50  |    |    |     |    |    |     | 50 |    |     |    | 50 |      |    |    |      |  |       | 250 g |       |  |      |
| GT K ステップ    | 微細粒肥料           | 6       |      | 26  |      | 1    |      |      | 0.02 |     |       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     | 20 |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |      |    |    |      |  | 20 g  |       |       |  |      |
| WSF 25-5-20  | 粉末液肥            | 25      | 5    | 20  |      | 0.07 | 0.01 |      | 0.01 |     |       |     | 2  |    |     | 2  |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |      |    |    |      |  |       | 4 g   |       |  |      |
| ストレスバスター     | バイオスティミュラント     | 7.5     |      | 1.5 |      |      |      |      | 0.01 |     |       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    | 2   |    |    |     |    |    |     |    |    | 2   |    |    |     |    |    |      |    |    |      |  |       | 4 ml  |       |  |      |
| NB30P        | 微生物入り肥料         | 4       | 30   | 6   |      | 5    |      |      |      |     |       |     |    |    |     | 2  |    |     | 2  |    |     | 2  |    |     | 2  |    |     | 2  |    |     | 2  |    |     | 2  |    |     | 2  |    |      |    |    |      |  |       | 16 g  |       |  |      |
| りんご Ca       | カルシウム入り<br>微量要素 | 3       |      | 1   | 7.5  | 1.5  |      | 0.2  | 0.2  | 0.2 |       |     |    |    |     |    | 1  |     | 1  | 1  |     | 2  |    |     | 2  |    | 2   |    | 2  |     | 2  |    | 2   |    |    | 2   |    |    | 1    |    |    |      |  |       |       | 20 ml |  |      |
| オリゴエイド       | トレハロース+海藻       |         |      | 3   |      | 1    |      |      |      |     |       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    | 2   |    |    | 2   |    |    |     | 2  |    | 2   |    |    |     |    |    |      |    |    |      |  |       | 8 g   |       |  |      |
| ビオグリーン       | トレハロース+鉄        |         |      |     |      |      |      | 12.5 |      |     |       | 2   |    |    | 2   |    |    | 2   |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     | 2  |    |      | 2  |    |      |  |       | 10 g  |       |  |      |
| エコゾ腐植元 Kelp  | 腐植酸             | 0.01    | 0.01 | 4   | 0.04 | 0.04 |      |      |      |     |       |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     | 1  |    |     | 1  |    |     | 1  |    |     | 1  |    |     | 1  |    |     |    |    |      |    |    |      |  |       | 5 ml  |       |  |      |
| 洗浄王          | 土壌洗浄剤           |         |      |     |      |      |      |      |      |     |       |     |    |    |     |    |    |     | 1  |    |     | 1  |    |     | 1  |    |     | 1  |    |     | 1  |    |     | 1  |    |     |    |    |      |    |    |      |  |       | 7 ml  |       |  |      |

年間施肥成分量（ベントグリーン）

| 成 分  |    |        |                                                                 | 作 用                                       | 施肥量 | 1 月    | 2 月    | 3 月  | 4 月   | 5 月   | 6 月   | 7 月   | 8 月   | 9 月   | 10 月  | 11 月  | 12 月  | ㎡ 合計     |
|------|----|--------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|--------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 三要素  | N  | チッソ    | NH <sub>4</sub> -N<br>NO <sub>2</sub> -N<br>NO <sub>3</sub> -N  | 生命維持に必要なタンパク質、ホルモン、葉緑素、ビタミン、酵素などの構成要素     | 月別量 | 0.50   | 0.50   | 3.14 | 0.17  | 1.34  | 0.29  | 0.20  | 0.14  | 0.29  | 3.14  | 0.03  |       | 9.74 g   |
|      |    |        |                                                                 |                                           | 累計量 | 0.50   | 1.00   | 4.14 | 4.31  | 5.65  | 5.94  | 6.14  | 6.28  | 6.57  | 9.71  | 9.74  | 9.74  |          |
|      |    |        |                                                                 |                                           |     | 0.10   | 0.10   | 4.10 | 0.95  | 0.95  | 0.60  | 0.95  | 0.60  | 0.95  | 4.10  | 0.35  |       |          |
|      | P  | リンサン   | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub><br>H <sub>3</sub> PO <sub>3</sub> | 光合成、タンパク質合成、広範囲の植物成長と新陳代謝に必要              | 月別量 | 0.10   | 0.10   | 4.10 | 0.95  | 0.95  | 0.60  | 0.95  | 0.60  | 0.95  | 4.10  | 0.35  |       | 13.75 g  |
|      |    |        |                                                                 |                                           | 累計量 | 0.10   | 0.20   | 4.30 | 5.25  | 6.20  | 6.80  | 7.75  | 8.35  | 9.30  | 13.40 | 13.75 | 13.75 |          |
|      |    |        |                                                                 |                                           |     | 0.40   | 0.40   | 3.14 | 1.60  | 6.83  | 0.27  | 1.71  | 0.24  | 1.72  | 3.14  | 1.46  |       |          |
|      | K  | カリ     | K <sub>2</sub> O                                                | 茎や根の細胞隔壁、タンパク、炭水化物、デンプン、糖の合成              | 月別量 | 0.40   | 0.40   | 3.14 | 1.60  | 6.83  | 0.27  | 1.71  | 0.24  | 1.72  | 3.14  | 1.46  |       | 20.91 g  |
|      |    |        |                                                                 |                                           | 累計量 | 0.40   | 0.80   | 3.94 | 5.54  | 12.37 | 12.64 | 14.35 | 14.59 | 16.31 | 19.45 | 20.91 | 20.91 |          |
|      |    |        |                                                                 |                                           |     |        |        |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
| 中位要素 | Ca | カルシウム  | CaO                                                             | 酵素の活性化、細胞隔壁の構成物質、細胞内の水分の動きに影響、細胞の成長と分裂に必要 |     |        |        | 0.15 | 1.23  | 1.15  | 0.15  | 1.30  | 0.15  | 1.15  | 0.15  | 1.08  |       | 6.51 g   |
|      | Mg | マグネシウム | MgO                                                             | 葉緑素分子の構成に必要不可欠、脂肪、糖、炭水化物を生産の植物酵素の機能       |     |        |        | 1.13 | 1.48  | 1.67  | 0.15  | 1.52  | 0.15  | 1.49  | 1.13  | 1.35  |       | 10.07 g  |
| 微量要素 | B  | ホウソ    | B                                                               | 細胞壁の組成、皮膜の維持、カルシウムの吸収、糖の代謝に必要             |     | 0.0002 | 0.0002 |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0.0004 g |
|      | Fe | 鉄      | Fe                                                              | 光合成に関与                                    |     | 0.25   | 0.25   | 0.25 | 3.19  | 3.19  |       | 3.19  |       | 3.19  |       | 3.44  | 0.25  | 17.2 g   |
|      | Mn | マンガン   | Mn                                                              | 光合成、呼吸、窒素の代謝のための酵素の活動に影響する                |     |        |        |      | 0.116 | 0.118 | 0.004 | 0.118 | 0.004 | 0.114 | 0.004 | 0.112 |       | 0.59 g   |
|      | Zn | 亜鉛     | Zn                                                              | 酵素の構成要素、あるいはオーキシンを含むたくさんの酵素の機能の共同因子       |     |        |        |      | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.002 |       | 0.036 g  |
|      | Si | ケイ酸    | Si・SiO                                                          | 細胞壁に多く含まれる。水溶性ケイ素は植物の耐寒性、耐暑性の改善に効果をもつ     |     |        |        |      | 29.08 | 29.08 |       | 29.08 |       | 29.08 |       | 29.08 |       | 145.40 g |

## 年間計画（殺菌剤）

| 1月     |    |    | 2月 |    |    | 3月 |               |    | 4月 |                               |    | 5月 |               |    | 6月      |                |    | 7月 |                             |    | 8月 |                           |    | 9月 |                      |    | 10月 |                 |    | 11月 |                |    | 12月 |               |  |        |                  |  |  |        |  |  |    |  |  |       |
|--------|----|----|----|----|----|----|---------------|----|----|-------------------------------|----|----|---------------|----|---------|----------------|----|----|-----------------------------|----|----|---------------------------|----|----|----------------------|----|-----|-----------------|----|-----|----------------|----|-----|---------------|--|--------|------------------|--|--|--------|--|--|----|--|--|-------|
| 上旬     | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬            | 下旬 | 上旬 | 中旬                            | 下旬 | 上旬 | 中旬            | 下旬 | 上旬      | 中旬             | 下旬 | 上旬 | 中旬                          | 下旬 | 上旬 | 中旬                        | 下旬 | 上旬 | 中旬                   | 下旬 | 上旬  | 中旬              | 下旬 | 上旬  | 中旬             | 下旬 |     |               |  |        |                  |  |  |        |  |  |    |  |  |       |
| 病害発生時期 |    |    |    |    |    |    |               |    |    |                               |    |    |               |    |         | 炭疽病            |    |    |                             |    |    |                           |    |    |                      |    |     |                 |    |     |                |    |     |               |  |        |                  |  |  | 病害発生時期 |  |  |    |  |  |       |
|        |    |    |    |    |    |    |               |    |    |                               |    |    |               |    |         |                |    |    |                             |    |    |                           |    |    |                      |    |     |                 |    |     |                |    |     |               |  |        |                  |  |  |        |  |  |    |  |  |       |
|        |    |    |    |    |    |    |               |    |    |                               |    |    |               |    |         |                |    |    |                             |    |    |                           |    |    |                      |    |     |                 |    |     |                |    |     |               |  |        |                  |  |  |        |  |  |    |  |  |       |
|        |    |    |    |    |    |    |               |    |    |                               |    |    |               |    |         |                |    |    |                             |    |    |                           |    |    |                      |    |     |                 |    |     |                |    |     |               |  |        |                  |  |  |        |  |  |    |  |  |       |
|        |    |    |    |    |    |    |               |    |    |                               |    |    |               |    |         |                |    |    |                             |    |    |                           |    |    |                      |    |     |                 |    |     |                |    |     |               |  |        |                  |  |  |        |  |  |    |  |  |       |
|        |    |    |    |    |    |    |               |    |    |                               |    |    |               |    |         |                |    |    |                             |    |    |                           |    |    |                      |    |     |                 |    |     |                |    |     |               |  |        |                  |  |  |        |  |  |    |  |  |       |
|        |    |    |    |    |    |    |               |    |    |                               |    |    |               |    | 葉枯病     |                |    |    |                             |    |    |                           |    |    |                      |    |     |                 |    |     |                |    |     |               |  | 病害発生時期 |                  |  |  |        |  |  |    |  |  |       |
|        |    |    |    |    |    |    |               |    |    |                               |    |    |               |    |         |                |    |    |                             |    |    |                           |    |    |                      |    |     |                 |    |     |                |    |     |               |  |        |                  |  |  |        |  |  |    |  |  |       |
|        |    |    |    |    |    |    |               |    |    |                               |    |    |               |    |         |                |    |    |                             |    |    |                           |    |    |                      |    |     |                 |    |     |                |    |     |               |  |        |                  |  |  |        |  |  |    |  |  |       |
|        |    |    |    |    |    |    |               |    |    |                               |    |    |               |    |         |                |    |    |                             |    |    |                           |    |    |                      |    |     |                 |    |     |                |    |     |               |  |        |                  |  |  |        |  |  |    |  |  |       |
|        |    |    |    |    |    |    |               |    |    |                               |    |    |               |    |         |                |    |    |                             |    |    |                           |    |    |                      |    |     |                 |    |     |                |    |     |               |  |        |                  |  |  |        |  |  |    |  |  |       |
|        |    |    |    |    |    |    |               |    |    |                               |    |    |               |    | ブラウンパッチ |                |    |    |                             |    |    |                           |    |    |                      |    |     |                 |    |     |                |    |     |               |  | 病害発生時期 |                  |  |  |        |  |  |    |  |  |       |
|        |    |    |    |    |    |    |               |    |    |                               |    |    |               |    |         |                |    |    |                             |    |    |                           |    |    |                      |    |     |                 |    |     |                |    |     |               |  |        |                  |  |  |        |  |  |    |  |  |       |
|        |    |    |    |    |    |    |               |    |    |                               |    |    |               |    |         |                |    |    |                             |    |    |                           |    |    |                      |    |     |                 |    |     |                |    |     |               |  |        |                  |  |  |        |  |  |    |  |  |       |
|        |    |    |    |    |    |    |               |    |    |                               |    |    |               |    |         |                |    |    |                             |    |    |                           |    |    |                      |    |     |                 |    |     |                |    |     |               |  |        |                  |  |  |        |  |  |    |  |  |       |
|        |    |    |    |    |    |    |               |    |    |                               |    |    |               |    | ダラースポット |                |    |    |                             |    |    |                           |    |    |                      |    |     |                 |    |     |                |    |     |               |  | 病害発生時期 |                  |  |  |        |  |  |    |  |  |       |
|        |    |    |    |    |    |    |               |    |    |                               |    |    |               |    |         |                |    |    |                             |    |    |                           |    |    |                      |    |     |                 |    |     |                |    |     |               |  |        |                  |  |  |        |  |  |    |  |  |       |
|        |    |    |    |    |    |    |               |    |    |                               |    |    |               |    |         |                |    |    |                             |    |    |                           |    |    |                      |    |     |                 |    |     |                |    |     |               |  |        |                  |  |  |        |  |  |    |  |  |       |
|        |    |    |    |    |    |    |               |    |    |                               |    |    |               |    | ピシウム病   |                |    |    |                             |    |    |                           |    |    |                      |    |     |                 |    |     |                |    |     |               |  | 病害発生時期 |                  |  |  |        |  |  |    |  |  |       |
|        |    |    |    |    |    |    |               |    |    |                               |    |    |               |    |         |                |    |    |                             |    |    |                           |    |    |                      |    |     |                 |    |     |                |    |     |               |  |        |                  |  |  |        |  |  |    |  |  |       |
| GREEN  |    |    |    |    |    |    | ↑<br>グラステン水和剤 |    |    | ↑<br>ターフトップDF                 |    |    | ↑<br>ダイブフロアブル |    |         | ↑<br>トップグラス DF |    |    | ↑<br>タチガレン液剤<br>デイスайдフロアブル |    |    | ↑<br>ガイア顆粒水和剤<br>サンブレイク液剤 |    |    | ↑<br>クインテクト<br>顆粒水和剤 |    |     | ↑<br>グリーンワーク WP |    |     | ↑<br>パッチコロソ水和剤 |    |     | ↑<br>グラステン水和剤 |  |        | ↑<br>デイスайдフロアブル |  |  |        |  |  |    |  |  | GREEN |
|        |    |    |    |    |    |    |               |    |    |                               |    |    |               |    |         |                |    |    |                             |    |    |                           |    |    |                      |    |     |                 |    |     |                |    |     |               |  |        |                  |  |  |        |  |  |    |  |  |       |
| TEEFW  |    |    |    |    |    |    |               |    |    | セレントーフ顆粒水和剤<br>シバンバ PRO フロアブル |    |    |               |    |         |                |    |    |                             |    |    |                           |    |    |                      |    |     |                 |    |     | イカルガ 35 SC     |    |     |               |  |        |                  |  |  | TEEFW  |  |  |    |  |  |       |
| RH     |    |    |    |    |    |    |               |    |    | セレントーフ顆粒水和剤<br>シバンバ PRO フロアブル |    |    |               |    |         |                |    |    |                             |    |    |                           |    |    |                      |    |     |                 |    |     |                |    |     | イカルガ 35 SC    |  |        |                  |  |  |        |  |  | RH |  |  |       |

## 年間計画（殺虫剤）

| 1月     |    |    | 2月 |    |    | 3月 |    |    | 4月    |                   |    | 5月 |    |    | 6月 |            |    | 7月 |            |    | 8月 |             |    | 9月 |    |    | 10月 |               |    | 11月 |    |    | 12月 |       |         |  |  |  |  |        |  |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------------------|----|----|----|----|----|------------|----|----|------------|----|----|-------------|----|----|----|----|-----|---------------|----|-----|----|----|-----|-------|---------|--|--|--|--|--------|--|
| 上旬     | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬    | 中旬                | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬         | 下旬 | 上旬 | 中旬         | 下旬 | 上旬 | 中旬          | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬  | 中旬            | 下旬 | 上旬  | 中旬 | 下旬 |     |       |         |  |  |  |  |        |  |
| 害虫繁殖時期 |    |    |    |    |    |    |    |    |       |                   |    |    |    |    |    |            |    |    |            |    |    |             |    |    |    |    |     |               |    |     |    |    |     |       |         |  |  |  |  | 害虫繁殖時期 |  |
|        |    |    |    |    |    |    |    |    |       |                   |    |    |    |    |    |            |    |    |            |    |    |             |    |    |    |    |     |               |    |     |    |    |     |       |         |  |  |  |  |        |  |
|        |    |    |    |    |    |    |    |    |       |                   |    |    |    |    |    |            |    |    |            |    |    |             |    |    |    |    |     |               |    |     |    |    |     |       |         |  |  |  |  |        |  |
|        |    |    |    |    |    |    |    |    |       |                   |    |    |    |    |    |            |    |    |            |    |    |             |    |    |    |    |     |               |    |     |    |    |     |       |         |  |  |  |  |        |  |
|        |    |    |    |    |    |    |    |    | シバツトガ |                   |    |    |    |    |    |            |    |    |            |    |    |             |    |    |    |    |     |               |    |     |    |    |     |       |         |  |  |  |  |        |  |
|        |    |    |    |    |    |    |    |    | タマナヤガ |                   |    |    |    |    |    |            |    |    |            |    |    |             |    |    |    |    |     |               |    |     |    |    |     |       |         |  |  |  |  |        |  |
| GREEN  |    |    |    |    |    |    |    |    | ▲     |                   |    |    |    | ▲  |    |            |    | ▲  |            |    |    |             |    |    |    |    | ▲   |               |    |     |    |    |     | GREEN |         |  |  |  |  |        |  |
|        |    |    |    |    |    |    |    |    |       | テラフロアブル           |    |    |    |    |    | ナイスイーグル SG |    |    |            |    |    | スティンガーフロアブル |    |    |    |    |     | サニーフィールド MC   |    |     |    |    |     |       | テラフロアブル |  |  |  |  |        |  |
| TEEW   |    |    |    |    |    |    |    |    |       | テラフロアブル           |    |    |    |    |    |            |    |    | ナイスイーグル SC |    |    |             |    |    |    |    |     | スティンガーフロアブル   |    |     |    |    |     |       |         |  |  |  |  | TEEW   |  |
|        |    |    |    |    |    |    |    |    |       | グレモ SC<br>テラフロアブル |    |    |    |    |    |            |    |    | ナイスイーグル SC |    |    |             |    |    |    |    |     | タフスティンガーフロアブル |    |     |    |    |     |       |         |  |  |  |  |        |  |
| RH     |    |    |    |    |    |    |    |    |       |                   |    |    |    |    |    |            |    |    |            |    |    |             |    |    |    |    |     |               |    |     |    |    |     |       |         |  |  |  |  | RH     |  |
|        |    |    |    |    |    |    |    |    |       |                   |    |    |    |    |    |            |    |    |            |    |    |             |    |    |    |    |     |               |    |     |    |    |     |       |         |  |  |  |  |        |  |

## 年間計画（施肥他）

|                       | 1 月             | 2 月 | 3 月 | 4 月     | 5 月 | 6 月                     | 7 月 | 8 月 | 9 月                 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |                       |
|-----------------------|-----------------|-----|-----|---------|-----|-------------------------|-----|-----|---------------------|------|------|------|-----------------------|
| T<br>E<br>E<br>F<br>W |                 |     |     | イデコンポ   |     |                         |     |     | グリーンスター<br>モデナ シリーズ |      |      |      | T<br>E<br>E<br>F<br>W |
| R<br>H                | ターフェバー<br>(融雪剤) |     |     | グリーンスター |     | グリーンフィールド水和剤<br>(成長調整剤) |     |     | イデコンポ<br>モデナ シリーズ   |      |      |      | R<br>H                |

液肥

| 商 品 名 | 規 格             | 価 格 (円)       | N - P - K | Mg           | Ca | Fe | アミノ酸 | その他       | 使用量 (m <sup>2</sup> ) |
|-------|-----------------|---------------|-----------|--------------|----|----|------|-----------|-----------------------|
| 液肥    | ユニット<br>リカーグリーン | 12kg<br>(10L) | 19,000    | 6 - 5 - 5    |    |    |      | ● 有機 30   | 4 ～ 8ml               |
|       |                 |               |           | 微生物入りアミノ酸肥料  |    |    |      |           |                       |
|       | ユニット<br>リカーレッド  | 12kg<br>(10L) | 19,000    | 2.5 - 8 - 8  |    |    |      | ● 有機 25   | 4 ～ 8ml               |
|       |                 |               |           | 微生物入りアミノ酸肥料  |    |    |      |           |                       |
|       | ラ・バーゼ           | 10L           | 10,000    | 7 - 2 - 3    |    |    |      | ● 微量要素、糖類 | 1 ～ 2ml               |
|       |                 |               |           | ベタイン含有天然ミネラル |    |    |      |           |                       |

粉末液肥

|      |                |        |        |                    |   |  |  |  |      |
|------|----------------|--------|--------|--------------------|---|--|--|--|------|
| 粉末液肥 | モデナ<br>アフロディーテ | 1kg×10 | 18,000 | 18 - 5 - 15        | ● |  |  |  | 2～5g |
|      |                |        |        | グリーン用液肥の素 色出し即効性肥料 |   |  |  |  |      |
|      | モデナ<br>アルテミス   | 1kg×10 | 20,000 | 11 - 13 - 9        | 2 |  |  |  | 1～5g |
|      |                |        |        | グリーン用液肥の素 ポーラス肥料   |   |  |  |  |      |

リン酸資材

|       |                    |        |        |                                |   |  |  |  |         |
|-------|--------------------|--------|--------|--------------------------------|---|--|--|--|---------|
| リン酸資材 | スーパー M リン PK<br>細粒 | 12.5kg | 7,000  | 0 - 35 - 5                     |   |  |  |  | 12.5g   |
|       |                    |        |        | 粒状。独自の微生物と酵素（M リンカリン）の働きで効果が持続 |   |  |  |  |         |
|       | NB30P              | 2kg×5  | 35,000 | 4 - 30 - 6                     | 5 |  |  |  | 2g      |
|       |                    |        |        | 粉末。独自の微生物と酵素（M リンカリン）の働きで効果が持続 |   |  |  |  |         |
|       | P K インパクト          | 10L    | 35,000 | 3 - 30 - 15                    |   |  |  |  | 1 ～ 2ml |
|       |                    |        |        | 亜リン酸を 100%使用した葉面散布肥料           |   |  |  |  |         |

UVカット剤

|        |         |          |        |          |  |  |  |  |           |
|--------|---------|----------|--------|----------|--|--|--|--|-----------|
| UVカット剤 | インターセプト | 500ml×10 | 52,000 |          |  |  |  |  | 0.1～0.5ml |
|        |         |          |        | 抗強光ストレス剤 |  |  |  |  |           |

| 商 品 名 | 規 格             | 価 格 (円) | N - P - K | Mg              | Ca   | Fe   | アミノ酸 | その他            | 使用量 (m <sup>2</sup> ) |
|-------|-----------------|---------|-----------|-----------------|------|------|------|----------------|-----------------------|
| 腐植酸資材 | エコゾア腐植元<br>Kelp | 5L×4    | 48,000    | 0.01 - 0.01 - 4 | 0.04 | 0.04 | ●    | ● 腐植酸 8.8、微量要素 | 2ml                   |
|       |                 |         |           | 液体フミン酸、海藻エキス    |      |      |      |                |                       |
|       | エコゾア腐植元<br>リキッド | 5L×4    | 47,000    | 0.13 - 0.04 - 6 | 0.03 | 0.03 |      | ● 腐植酸 18、微量要素  | 2ml                   |
|       |                 |         |           | 液体フミン酸          |      |      |      |                |                       |

腐植酸資材

|        |               |        |        |                  |  |  |  |        |         |
|--------|---------------|--------|--------|------------------|--|--|--|--------|---------|
| アミノ酸資材 | バイソンパワー       | 2kg×9  | 43,000 | 8 - 0 - 2        |  |  |  | ●      | 1 ～ 2g  |
|        |               |        |        | アニマルプロテインアミノ酸    |  |  |  |        |         |
|        | ボニートスター       | 1L×10  | 23,000 | 6 - 2 - 1        |  |  |  | ● 微量要素 | 1 ～ 2ml |
|        |               |        |        | カツオ 100%アミノ酸     |  |  |  |        |         |
|        | M S - Z E R O | 12kg×2 | 37,500 | 2 - 6 - 5        |  |  |  | ● 微量要素 | 1 ～ 3ml |
|        |               |        |        | 核酸、アミノ酸、有機酸、微量要素 |  |  |  |        |         |

アミノ酸資材

微量要素資材

|                   |               |        |                   |     |     |     |   |          |          |
|-------------------|---------------|--------|-------------------|-----|-----|-----|---|----------|----------|
| エコゾア<br>マリーンエイド   | 200g×20       | 52,000 |                   |     | ●   | ●   |   | 微量要素、糖類  | 0.25g    |
|                   |               |        | 100%海藻抽出エキス       |     |     |     |   |          |          |
| オーガニック Mg         | 18L<br>(20kg) | 22,400 | 4 - 0 - 2         |     |     | 0.3 |   | 微量要素、糖類  | 2 ～ 4ml  |
|                   |               |        | 液体マグネシウム          |     |     |     |   |          |          |
| アルゲライザー           | 1kg×12        | 59,760 | 7 - 4 - 3         | ●   |     | ●   | ● | 微量要素     | 0.25～1g  |
|                   |               |        | 特殊海藻クリーム入り葉面散布肥料  |     |     |     |   |          |          |
| TG ケルプ<br>マルチ微量要素 | 5L×2          | 22,700 | 3.9 - 0 - 1       | ●   |     | ●   |   | 微量要素     | 2 ～ 3ml  |
|                   |               |        | 海藻エキス由来の微量要素      |     |     |     |   |          |          |
| りんご Ca            | 20L           | 26,500 | 3 - 0 - 1         | 1.5 | 7.5 | 0.2 |   | 微量要素     | 1 ～ 2ml  |
|                   | 10L           | 13,900 | 水溶性キレートカルシウム      |     |     |     |   |          |          |
| Always G          | 2kg×10        | 25,000 | 5 - 0 - 0         | 16  |     | 0.7 |   | 微量要素、糖類  | 1 ～ 2 g  |
|                   |               |        | 水溶性総合微量要素         |     |     |     |   |          |          |
| ピタリ G1            | 1L×10         | 27,000 | 0.44 - 0.17 - 8.2 | ●   | ●   | ●   |   | 全糖36.3、他 | 1 ～ 5 ml |
|                   | 5L×3          | 36,000 |                   |     |     |     |   |          |          |
|                   | 10L×2         | 46,000 | 葉面散布葉剤(糖蜜)        |     |     |     |   |          |          |

微量要素資材

ケイ酸資材

| 商 品 名 |                  | 規 格  | 価 格 (円) | N - P - K                        | Mg | Ca | Fe  | アミノ酸 | その他  | 使用量 (m²) |
|-------|------------------|------|---------|----------------------------------|----|----|-----|------|------|----------|
| ケイ酸資材 | 総合ミネラル宝素<br>(細粒) | 20kg | 2,600   | 0 - 0.7 - 2.9                    |    |    | 6.4 |      | 微量元素 | 50～100g  |
|       |                  |      |         | 珪酸質 58%を主体に、その他微量元素を含む天然鉱物質土壌改良剤 |    |    |     |      |      |          |
|       | 総合ミネラル宝素<br>(粒)  | 20kg | 2,200   | 0 - 0.7 - 2.9                    |    |    | 6.4 |      | 微量元素 | 50～100g  |
|       |                  |      |         | 珪酸質 58%を主体に、その他微量元素を含む天然鉱物質土壌改良剤 |    |    |     |      |      |          |

活性剤

|     |             |               |        |           |   |  |  |   |         |             |
|-----|-------------|---------------|--------|-----------|---|--|--|---|---------|-------------|
| 活性剤 | アクアビュー 10   | 10L<br>キュービター | 34,000 |           |   |  |  | ● |         | 0.125 ～ 1ml |
|     | 天然アミノ酸 100% |               |        |           |   |  |  |   |         |             |
| 活性剤 | オリゴエイド      | 1kg×20        | 48,000 | 0 - 0 - 3 | 1 |  |  |   | 微量要素、糖類 | 2g          |
|     | トレハロース剤＋海藻  |               |        |           |   |  |  |   |         |             |

鉄資材

|     |                                |          |        |                    |   |  |      |   |         |         |
|-----|--------------------------------|----------|--------|--------------------|---|--|------|---|---------|---------|
| 鉄資材 | イデターフ                          | 5kg×4    | 25,000 | 0.08 - 0.09 - 0.27 |   |  | 16.7 |   | ケイ酸 24  | 1 ～ 5g  |
|     | ケイ酸がストレスに強い丈夫な芝を育てる水和タイプの土壌改良剤 |          |        |                    |   |  |      |   |         |         |
| 鉄資材 | グリーンアース                        | 20L      | 19,000 |                    | ● |  | ●    | ● | 糖類      | 5 ～ 8ml |
|     | 活力剤                            |          |        |                    |   |  |      |   |         |         |
| 鉄資材 | バイオグリーン                        | 1kg×20   | 49,000 |                    |   |  | 12.5 |   | 微量元素、糖類 | 2g      |
|     | トレハロース剤＋鉄                      |          |        |                    |   |  |      |   |         |         |
| 鉄資材 | バイオプラス                         | 1 L × 10 | 40,800 |                    |   |  | 25   |   | 微量元素、糖類 | 1 ～ 2ml |
|     | 活性酸素による発根刺激と抗菌作用               |          |        |                    |   |  |      |   |         |         |

微生物資材・分解資材

|            |                                                 |         |         |  |  |  |  |  |    |                          |
|------------|-------------------------------------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|----|--------------------------|
| 微生物資材・分解資材 | ターフリセッター                                        | 200g×20 | 110,000 |  |  |  |  |  |    | 0.08～0.1g/m <sup>2</sup> |
|            | バチルス属細菌。芝生のサッチを強力に分解                            |         |         |  |  |  |  |  |    |                          |
| 微生物資材・分解資材 | バイオシュート EX                                      | 500g×10 | 85,000  |  |  |  |  |  | 糖類 | 0.2～0.4g                 |
|            | バチルス菌（生芽胞）：5×10 <sup>9</sup> CFU/g 配合 サッチ分解促進資材 |         |         |  |  |  |  |  |    |                          |

| 商 品 名 |            | 規 格    | 価 格 (円) | N - P - K                 | Mg | Ca | Fe | アミノ酸 | その他 | 使用量 (㎡)   |
|-------|------------|--------|---------|---------------------------|----|----|----|------|-----|-----------|
| グリーン用 | 芝太郎 1 号 細粒 | 20kg   | 5,300   | 6 - 7 - 6                 | 2  |    |    |      |     | 30g       |
|       |            |        |         | 芝生専用有機化成肥料                |    |    |    |      |     |           |
|       | 芝太郎 SF-85  | 500g×6 | 54,000  |                           |    |    |    |      |     | 0.15~0.5g |
|       |            |        |         | トリコデルマ菌、ペニシリウム、アスペルギルス菌入り |    |    |    |      |     |           |

※ セットで使用を推奨します。

|       |                      |      |       |           |  |  |  |  |       |        |
|-------|----------------------|------|-------|-----------|--|--|--|--|-------|--------|
| グリーン用 | グリーンスター 細粒           | 15kg | 3,600 | 4 - 2 - 4 |  |  |  |  |       | 20g    |
|       | 動物性有機 40%、植物性有機 11%  |      |       |           |  |  |  |  |       |        |
| グリーン用 | マイクロユニット             | 20kg | 4,200 | 4 - 2 - 4 |  |  |  |  | 有機 60 | 30～60g |
|       | アミノ酸、黒皮粒、腐植酸醗酵微生物菌配合 |      |       |           |  |  |  |  |       |        |

グリーン用微生物資材

粒状肥料

|            |                                     |      |       |              |     |  |  |  |        |          |
|------------|-------------------------------------|------|-------|--------------|-----|--|--|--|--------|----------|
| FW、TEE、RH用 | イデコンポ EV                            | 20kg | 6,000 | 10 - 2 - 4   | 0.7 |  |  |  | 腐植酸 22 | 30g      |
|            | 2 種類のバチルス菌で病原菌への拮抗作用とサッチ分解能力が向上     |      |       |              |     |  |  |  |        |          |
| FW、TEE、RH用 | グリーンスター                             | 15kg | 3,500 | 5 - 3 - 4    |     |  |  |  |        | 30 ～ 50g |
|            | 動物性有機質 40%、植物性有機質 11%               |      |       |              |     |  |  |  |        |          |
| FW、TEE、RH用 | モデナ UF 77/UF77MG                    | 20kg | 8,000 | 22 - 5 - 11  |     |  |  |  | UF17   | 15 ～ 40g |
|            | メチレン尿素（UF 17%）と化成肥料を配合した緩効性窒素入り肥料   |      |       |              |     |  |  |  |        |          |
| FW、TEE、RH用 | モデナ UF 60R                          | 20kg | 7,800 | 23 - 6 - 7   |     |  |  |  | UF13.8 | 15 ～ 40g |
|            | メチレン尿素（UF 13.8%）と化成肥料を配合した緩効性窒素入り肥料 |      |       |              |     |  |  |  |        |          |
| FW、TEE、RH用 | モデナ エコニック 30                        | 20kg | 3,700 | 8 - 8 - 8    |     |  |  |  | 有機 30  | 30～60g   |
|            | 有機含有の化成肥料                           |      |       |              |     |  |  |  |        |          |
| FW、TEE、RH用 | モデナ エコニックファイン                       | 20kg | 4,000 | 8 - 8 - 8    |     |  |  |  | 有機 30  | 30～60g   |
|            | 有機含有の化成肥料。細粒品                       |      |       |              |     |  |  |  |        |          |
| FW、TEE、RH用 | モデナ エコニック X                         | 20kg | 3,900 | 10 - 10 - 10 | 2   |  |  |  | 有機 10  | 30～60g   |
|            | 有機含有の化成肥料                           |      |       |              |     |  |  |  |        |          |
| FW、TEE、RH用 | モデナ エコニックライツ                        | 20kg | 3,600 | 8 - 2 - 5    |     |  |  |  | 有機 30  | 30～60g   |
|            | 有機含有の化成肥料                           |      |       |              |     |  |  |  |        |          |
| FW、TEE、RH用 | ユニット II                             | 20kg | 4,400 | 7 - 2 - 4    |     |  |  |  | 有機 60  | 20～50g   |
|            | アミノ酸、黒皮粒、腐植酸醗酵微生物菌配合                |      |       |              |     |  |  |  |        |          |

| 商 品 名     |                      | 規 格  | 粒径(mm)    | 価格(円)  | N - P - K                       | Mg | Ca | Fe | アミノ酸 | その他  | 使用量 (m <sup>2</sup> ) |
|-----------|----------------------|------|-----------|--------|---------------------------------|----|----|----|------|------|-----------------------|
| グリーン用粒肥   | GT グリーنز             | 20kg | 0.7～1.4   | 27,000 | 21-5-10                         | ●  | ●  | ●  |      | 微量元素 | 10 ～ 25g              |
|           |                      |      |           |        | 多種類の微量元素を含み、サンドグリーンに効果的         |    |    |    |      |      |                       |
|           | GT N・K               | 20kg | 0.7～1.4   | 21,800 | 18-0-18                         | ●  |    |    |      |      | 10 ～ 25g              |
|           |                      |      |           |        | 窒素、カリとも緩効性、バランスの良い肥料            |    |    |    |      |      |                       |
|           | GT ハイ K グリーン         | 20kg | 0.7～1.4   | 21,900 | 14-0-25                         | ●  | ●  | ●  |      | 微量元素 | 10 ～ 25g              |
|           |                      |      |           |        | 緩効性カリ含有で各種抵抗性向上させる              |    |    |    |      |      |                       |
|           | GT スーパーグリーン          | 20kg | 0.7～1.4   | 24,500 | 15-0-15                         | ●  | ●  | ●  |      | 微量元素 | 10 ～ 25g              |
|           |                      |      |           |        | アンモニア性窒素を多く含み、素早い緑色向上に優れる       |    |    |    |      |      |                       |
|           | GT K ステップ            | 20kg | 0.7～1.4   | 22,800 | 6-0-26                          | ●  | ●  | ●  |      | 微量元素 | 10 ～ 25g              |
|           |                      |      |           |        | 暑くなる前、寒くなる前の施肥の必需品              |    |    |    |      |      |                       |
|           | GT スターター             | 20kg | 0.7～1.4   | 28,500 | 18-20-5                         | ●  | ●  |    |      | 微量元素 | 10 ～ 25g              |
|           |                      |      |           |        | 播種時・張芝時、傷んだ芝生の回復の必需品            |    |    |    |      |      |                       |
| 微量元素      | ステップハイマグ             | 20kg | 0.7 ～ 2.0 | 22,000 |                                 | ●  | ●  | ●  |      | 微量元素 | 7 ～ 11g               |
|           |                      |      |           |        | 粒状総合微量元素材                       |    |    |    |      |      |                       |
| フェアウェイ用粒肥 | SB ポリ S 細粒           | 25kg | 0.85～2.0  | 21,300 | 21-5-13                         |    | ●  |    |      |      | 15 ～ 25g              |
|           |                      |      |           |        | 全 N の 73%、全 K の 27% がコーティング     |    |    |    |      |      |                       |
|           | ポリ S プロターフ           | 25kg | 1.3～2.5   | 19,500 | 21-5-6                          | ●  | ●  |    |      | 微量元素 | 15 ～ 25g              |
|           |                      |      |           |        | 全 N の 25%がコーティング。天然鉱物「ポリヘライト」混合 |    |    |    |      |      |                       |
|           | ポリ S プロターフ N・K       | 25kg | 1.3～2.5   | 15,000 | 15-5.5-15                       | ●  | ●  |    |      |      | 15 ～ 25g              |
|           |                      |      |           |        | 全 N の 25%がコーティングされ、カリを含む        |    |    |    |      |      |                       |
|           | ポリ S プロターフ ハイ K      | 25kg | 1.3～2.5   | 17,600 | 13.5-5-20                       | ●  | ●  |    |      | 微量元素 | 15 ～ 25g              |
|           |                      |      |           |        | 全 N の 25%がコーティングされ、カリを多く含む      |    |    |    |      |      |                       |
| 粉末液肥      | スポーツマスター ハイ N        | 15kg |           | 22,000 | 35-0-14                         |    |    | ●  |      |      | 1 ～ 4g                |
|           |                      |      |           |        | 窒素成分が高く、キレート化された鉄が配合            |    |    |    |      |      |                       |
|           | スポーツマスター ハイ K        | 15kg |           | 31,000 | 14.5-0-42                       |    |    | ●  |      |      | 2 ～ 5g                |
|           |                      |      |           |        | カリ成分が高く、キレート化された鉄が配合            |    |    |    |      |      |                       |
|           | スポーツマスター スプリング & サマー | 15kg |           | 23,100 | 27-5-18                         |    |    | ●  |      | 微量元素 | 1 ～ 5g                |
|           |                      |      |           |        | 各種微量元素がバランス良く配合                 |    |    |    |      |      |                       |

| 商 品 名       |                | 規 格       | 粒径(mm) | 価格(円)         | N - P - K                                     | Mg | Ca | Fe | アミノ酸 | その他  | 使用量 (m <sup>2</sup> ) |
|-------------|----------------|-----------|--------|---------------|-----------------------------------------------|----|----|----|------|------|-----------------------|
| 浸透剤         | H2 プロ トライスマート  | 5 L × 4   |        | 164,000       |                                               |    |    |    |      |      | 1 ～ 2.5ml             |
|             |                |           |        |               | 6 種類の界面活性剤を含み、素早く浸透。多方向                       |    |    |    |      |      |                       |
| 活性剤         | ストレスバスター       | 10 L × 2  |        | 50,000        | 7.5-0-1.5                                     |    |    | ●  |      | ●    | 2.5 ～ 5ml             |
|             |                |           |        |               | アミノ酸、糖類、微量元素に湿潤剤も含むバイオスティミュラント                |    |    |    |      |      |                       |
| ハイポネックス粉末液肥 | WSF 25-5-20    | 10kg      |        | 18,000        | 25-5-20                                       | ●  |    | ●  |      | 微量元素 | 1 ～ 5g                |
|             |                |           |        |               | 年間を通じての標準肥料としてお勧め                             |    |    |    |      |      |                       |
|             | WSF 30-10-10   | 10kg      |        | 15,800        | 30-10-10                                      | ●  |    | ●  |      | 微量元素 | 1 ～ 5g                |
|             |                |           |        |               | 窒素を多く含み、窒素供給が経済的                              |    |    |    |      |      |                       |
|             | WSF 12-0-17+Ca | 10kg      |        | 15,000        | 12-0-17                                       | ●  | ●  | ●  |      | 微量元素 | 1 ～ 7g                |
|             |                |           |        |               | CaO 補給、カリウムが多く丈夫な芝生に効果大                       |    |    |    |      |      |                       |
|             | WSF 15-30-15   | 10kg      |        | 18,300        | 15-30-15                                      |    |    |    |      | 微量元素 | 1 ～ 5g                |
|             |                |           |        |               | リン酸を多く含み、根の伸長を促進                              |    |    |    |      |      |                       |
| 微生物資材       | ソイルカルチャー       | 10L       |        | 20,900        | 0.5-0.5-0.5                                   |    |    |    |      |      | 2 ～ 4ml               |
|             |                |           |        |               | 微生物を特殊な条件で発酵・培養した液体資材                         |    |    |    |      |      |                       |
| バイオスティミュラント | ボンバルディア        | 1L×12 20L |        | 37,200 52,400 | 8-1.3-0.5未満                                   |    | ●  | ●  | ●    | 微量元素 | 0.5 ～ 1.0ml           |
|             |                |           |        |               | 植物原料由来の有機活力液肥。フルボ酸を 23% 含む                    |    |    |    |      |      |                       |
|             | ライゾー           | 1kg       |        | 16,800        | 8-4-0                                         |    |    |    | ●    |      | 0.1 ～ 0.2g            |
|             |                |           |        |               | 粉末タイプ根張り促進型肥料。アミノ酸 58%・糖類・ビタミン含有              |    |    |    |      |      |                       |
|             | グリベテン          | 1L        |        | 6,500         | 3-0-0.4                                       |    |    |    | ●    |      | 0.2 ～ 0.4ml           |
|             |                |           |        |               | グリシンベタイン、Ca・B の相互作用でストレス耐性を高める                |    |    |    |      |      |                       |
| 散布機         | アキュプロ 360ST    | 1 台       |        | 259,000       | アキュプロ 2000 後継 (2026 年 11 月頃開始) ヘリカルコーン内蔵肥料散布機 |    |    |    |      |      |                       |
|             | アキュプロドロップ      | 1 台       |        | 324,500       | SS-2 後継 (2026 年 6 月頃開始)                       |    |    |    |      |      |                       |

融雪剤

| 商品名 | 規格      | 価格(円) | N - P - K | Mg    | Ca | Fe | アミノ酸 | その他 | 使用量 (m <sup>2</sup> ) |
|-----|---------|-------|-----------|-------|----|----|------|-----|-----------------------|
| 融雪剤 | ターフエバー  | 17kg  | 37,400    |       |    |    |      |     | 500～2000 倍            |
|     |         |       |           | 液体融雪剤 |    |    |      |     |                       |
|     | SR ブラック | 18L   | 13,000    |       |    |    |      |     | 200 ～ 600 倍           |
|     |         |       |           | 液体融雪剤 |    |    |      |     |                       |

浸透剤

|     |         |         |        |                            |  |  |  |  |           |
|-----|---------|---------|--------|----------------------------|--|--|--|--|-----------|
| 浸透剤 | シャワーゾーン | 10L×2   | 90,400 |                            |  |  |  |  | 2 ～ 3ml   |
|     |         |         |        | 土壌のケアと水のケアをバランスよく配合した総合浸透剤 |  |  |  |  |           |
|     | 洗浄王     | 1L×10   | 35,000 |                            |  |  |  |  | 0.5 ～ 2ml |
|     |         |         |        | 土壌状態をリセットするための土壌洗浄剤        |  |  |  |  |           |
|     | テララ     | 5 L × 2 | 28,000 |                            |  |  |  |  | 1 ～ 2ml   |
|     |         |         |        | 天然系の浸透剤で根や土壌を傷めません         |  |  |  |  |           |

着色剤

| 商 品 名 |                      | 用 途          | 規 格    | 価 格 (円) | 使用 方法    | 備 考                                     |
|-------|----------------------|--------------|--------|---------|----------|-----------------------------------------|
| 着 色 剤 | フルグリーン<br>G-20       | グリーン用<br>着色剤 | 10kg   | 28,500  | 50～200 倍 | アクリル樹脂系着色剤                              |
|       | フルグリーン<br>S          | グリーン用<br>着色剤 | 10kg   | 28,500  | 100～200倍 | アクリル樹脂系着色剤、濃緑。経済的                       |
|       | ターフグリーン<br>BG        | グリーン用<br>着色剤 | 10kg×2 | 28,400  | 50～80 倍  | エマルジョン樹脂                                |
|       | ターフグリーン<br>KG        | 日本芝用着色剤      | 10kg×2 | 28,400  | 50～80 倍  | アクリル系樹脂                                 |
|       | ターフグリーン<br>SG II     | 日本芝用着色剤      | 10kg×2 | 28,400  | 50～80 倍  | 濃色。SG の樹脂を変更、増量                         |
|       | True Blue<br>EZソルパック | 池用着色剤        | 150g×6 | 44,800  | 1 袋      | 水溶性の袋(イーザーパック)を直接池に投入。1 袋で約1,250㎡の水をカバー |
|       | Jet Black<br>EZソルパック | 池用着色剤        | 150g×6 | 44,800  | 1 袋      | 水溶性の袋(イーザーパック)を直接池に投入。1 袋で約1,250㎡の水をカバー |

池浄化剤

| 商品名  | 粒 度        | 規 格                 | 価格(円)   | 特 徴    | 使用 方法                                                                                      |
|------|------------|---------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 池浄化剤 | セラクリーン 顆粒  | 1.2 ～ 4 mm          | 20kg    | 4,500  | 池の水環境を整え、水が透明に。<br>堆積物が減少します。<br><br>クリークや滝の吐き出し口に有効<br>池で使用する場合は1ケースで100m <sup>2</sup> 相当 |
|      | セラクリーン 粉末  | 1.2 mm 以下           | 20kg    | 4,300  |                                                                                            |
|      | セラクリーン 微粉末 | セラクリーン粉末をさらに細かくしたもの | 20kg    | 4,700  |                                                                                            |
|      | セラクリーン TBX | セラクリーン顆粒を円筒形に固めた固形物 | 350g×50 | 16,000 |                                                                                            |

展着剤

| 商品名 | 農薬登録番号               | 用 途      | 規 格                  | 価格(円)            | 使用方法           | 備 考                             |
|-----|----------------------|----------|----------------------|------------------|----------------|---------------------------------|
| 展着剤 | アイヤーエース 第 23072 号    | 展着剤      | 500ml×20             | 19,720           | 5000 ～ 10000 倍 | 消泡展着剤                           |
|     | アグラー 第 17188 号       | 展着剤      | 500ml×20             | 13,720           | 5000 ～ 10000 倍 |                                 |
|     | アプローチ BI 第 15763 号   | 機能性展着剤   | 500ml×20             | 27,000           | 500 ～ 1000 倍   | 高機能で浸透力が高い。比重が重いので、粒で落としたい場合に適す |
|     | グラミン P 第 24953 号     | 除草剤専用展着剤 | 500ml×20             | 14,000           | 5000 ～ 10000倍  | パーム油から抽出した、泡立ちの少ない展着剤           |
|     | サーファクタント WK 第 7019 号 | 除草剤専用展着剤 | 500ml×20             | 27,940           | 200 ～ 1000 倍   | 非イオン性。除草剤専用展着剤                  |
|     | ササラ 第 22156 号        | 湿展性展着剤   | 500ml×20             | 24,520           | 2000 ～ 4000 倍  | 消泡性があり湿展性も高い展着剤                 |
|     | ハイテンパワー 第 20481 号    | 機能性展着剤   | 100ml×60             | 24,900           | 5000～10000倍    | 少量で効果がある                        |
|     | ペタン V 第 14931 号      | 展着剤      | 10L×2                | 30,526           | 200 ～ 400 倍    | 固着性にすぐれ、雨による薬剤の流亡をふせぎ、効果を高める    |
|     | まくぴか 第 21216 号       | 展着剤      | 100ml×20<br>500ml×20 | 15,480<br>71,320 | 3000～10000倍    | シリコン系展着剤                        |

その他

|     |         |       |         |        |            |                                         |
|-----|---------|-------|---------|--------|------------|-----------------------------------------|
| その他 | サンプアート  | 芝用識別剤 | 400g×25 | 58,000 | 1500～4000倍 | 薬剤・肥料の重複散布ムラが確認できる                      |
|     | シリコンオイル | 泡消剤   | 1kg×15  | 65,700 | 適量         | 食品添加物なので安全で機械も傷めない<br>緑色の芝生が蘇る。エマルジョン樹脂 |

## 推奨除草剤

ゴルフ場管理資材のことなら 株式会社 マイスター

スズメノカタビラに高い除草効果

**アダッシュ顆粒水和剤**

シンジェンタ ジャパン株式会社

ヒメクダ・ハマスゲに安定して長く効く

**アップデート**

アグロ カネショウ株式会社

一年生雑草にすぐれた効果

**イデトップフロアブル**

株式会社 エス・ディー・エス バイオテック

芝生用土壌処理型除草剤

**コンクルードフロアブル**

株式会社ニッソーグリーン

低薬量・低コストで高効果

**シバゲンDF**

石原バイオサイエンス株式会社

安定した土壌処理層により抜群の除草効果

**バリケードフロアブル**

シンジェンタ ジャパン株式会社

# HERBICIDE

## 除草剤

| 商 品 名<br>農薬登録番号          | 主成分・含量（％）                | 系 統 名               | 規 格      | 価格(円)   | 薬 量 / ㎡        | 単 価 / ㎡ (円)   | 人畜<br>毒性 | 有 効 雑 草 種 |     |     |     |                                   |  |
|--------------------------|--------------------------|---------------------|----------|---------|----------------|---------------|----------|-----------|-----|-----|-----|-----------------------------------|--|
|                          |                          |                     |          |         |                |               |          | 一年生       |     | 多年生 |     | そ の 他 ・ 備 考                       |  |
|                          |                          |                     |          |         |                |               |          | 広葉        | イネ科 | 広葉  | イネ科 |                                   |  |
| アダッシュ顆粒水和水<br>第 24218 号  | プロピザミド 50                | 酸アミド系               | 1kg×10   | 87,720  | 0.3 ～ 0.5g     | 2.63 ～ 4.39   | 普        | ●         | ●   |     |     | スズメノカタビラ発生前～発生初期<br>※散布工事使用時のみの販売 |  |
| イデトップフロアブル<br>第 19758 号  | トリアジフラム 30               | トリアジン系              | 500ml×4  | 95,760  | 0.075 ～ 0.15ml | 3.59 ～ 7.18   | 普        | ●         | ●   |     |     | スズメノカタビラ 3 葉期まで                   |  |
| カーブ S C<br>第 22946 号     | プロピサミド 36                | 酸アミド系               | 1 L × 10 | 112,000 | 0.4 ～ 0.6ml    | 4.48 ～ 6.72   | 普        |           | ●   |     |     |                                   |  |
| カソロン粒剤 6.7<br>第 14217 号  | DBN 6.7                  | ニトリル系               | 3kg×8    | 24,904  | 6 ～ 15g        | 6.23 ～ 15.57  | 普        | ●         | ●   | ●   |     |                                   |  |
| カペレン粒剤 2.5<br>第 17159 号  | DBN 2.5                  | ニトリル系               | 5kg×4    | 20,300  | 8 ～ 10g        | 8.12 ～ 10.15  | 普        | ●         | ●   | ●   |     | ハマスゲ、ヒメクグ                         |  |
| キレダー<br>第 13870 号        | ACN                      | ナフトキノン系             | 500g×20  | 121,000 | 2 ～ 4g         | 24.20 ～ 48.40 | 普        |           |     |     |     | コケ類、藻類                            |  |
| コンクルードフロアブル<br>第 24885 号 | フルボキサム 42                | トリアゾロカルボキサミド系       | 500g×8   | 114,400 | 0.15 ～ 0.3g    | 4.29 ～ 8.58   | 普        | ●         | ●   |     |     | スズメノカタビラ                          |  |
| シバッチ乳剤<br>第 22791 号      | S-メトラクロール 83.7           | クロロアセトアミド系          | 1L×6     | 53,550  | 0.2 ～ 0.4ml    | 1.79 ～ 3.57   | 普        | ●         | ●   |     |     | ヒメクグ<br>※散布工事使用時のみの販売             |  |
| ターザインプロ DF<br>第 21088 号  | イソキサベン<br>フロラスラム 60<br>4 | 酸アミド系<br>トリアゾロピリミジン | 100g×20  | 119,200 | 0.03 ～ 0.05g   | 1.79 ～ 2.98   | 普        | ●         | ●   | ●   |     | 土壌兼茎葉処理剤                          |  |
| タフラー乳剤 80<br>第 20781 号   | ブタミホス 80                 | ホスホロアミデート系          | 1L×10    | 96,900  | 0.3 ～ 1.2ml    | 2.91 ～ 11.63  | 普        | ●         | ●   |     |     | キク科は無効                            |  |
| ディクトラン乳剤<br>第 17811 号    | ジチオピル 32                 | ピリジン系               | 500ml×10 | 190,900 | 0.075 ～ 0.3ml  | 2.86 ～ 11.45  | 普        | ●         | ●   |     |     | ヤハズ                               |  |
| バイザー水和剤<br>第 20396 号     | ジチオピル 40                 | ピリジン系               | 500g×4   | 98,400  | 0.05 ～ 0.2g    | 2.46 ～ 9.84   | 普        | ●         | ●   |     |     |                                   |  |
| ハブーン乳剤<br>第 20059 号      | アラクロール 43                | 酸アミド系               | 2L×6     | 56,460  | 0.6 ～ 1.2ml    | 2.82 ～ 5.65   | 普        | ●         | ●   |     |     | ヒメクグ                              |  |
| バリケードフロアブル<br>第 22082 号  | プロジアミン 40.7              | ジニトロアニリン系           | 500ml×10 | 116,000 | 0.125 ～ 0.25ml | 2.9 ～ 5.8     | 普        | ●         | ●   |     |     | ※散布工事使用時のみの販売                     |  |
| ポアキュア<br>第 23809 号       | メチオゾリン 25                | イソキサゾール系            | 100ml×10 | 129,000 | 0.2 ～ 0.4ml    | 25.8 ～ 51.6   | 普        |           | ●   |     |     | グリーン用スズメノカタビラ専用剤                  |  |

|                       |         |              |         |         |        |             |   |  |  |  |  |  |  |                |
|-----------------------|---------|--------------|---------|---------|--------|-------------|---|--|--|--|--|--|--|----------------|
| アルテリア水和剤<br>第 24083 号 | フマル酸 80 | (E)-2- ブテン二酸 | 500g×12 | 21,000  | 2 ～ 3g | 7.0 ～ 10.5  | 普 |  |  |  |  |  |  | かさ枯病、藻類        |
| キレダー<br>第 13870 号     | ACN 25  | ナフトキノン系      | 500g×20 | 121,000 | 2 ～ 4g | 24.2 ～ 48.4 | 普 |  |  |  |  |  |  | コケ類、藻類         |
| ポンドサロン                | 枯草菌     | バチルス属菌       | 400g×10 | 60,000  | 1.6g   | 24          |   |  |  |  |  |  |  | 500 ㎡に 2 パック投入 |

| 商 品 名<br>農薬登録番号               | 主成分・含量（％）                 | 系 統 名              | 規 格                | 価 格（円）           | 薬 量 / ㎡         | 単 価 / ㎡（円）  | 人畜<br>毒性 | 有 効 雑 草 種 |     |     |     |                                             |  |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------|----------|-----------|-----|-----|-----|---------------------------------------------|--|
|                               |                           |                    |                    |                  |                 |             |          | 一年生       |     | 多年生 |     | そ の 他 ・ 備 考                                 |  |
|                               |                           |                    |                    |                  |                 |             |          | 広葉        | イネ科 | 広葉  | イネ科 |                                             |  |
| アグリーン顆粒水和剤<br>第 22358 号       | ピラゾスルフロンエチル 70            | スルホニルウレア系          | 50g×20             | 132,000          | 0.02 ～ 0.03g    | 2.64～3.96   | 普        | ●         |     | ●   |     | ヒメクグ、ハマスゲ<br>※散布工事使用時のみの販売                  |  |
| アシュラスター液剤<br>第 23081 号        | アシュラム 30<br>MDBAカリウム塩 3.3 | 酸アミド系<br>芳香族カルボン酸系 | 1L×12              | 51,000           | 0.45 ～ 0.75ml   | 1.91 ～ 3.19 | 普        | ●         | ●   |     |     | マメ科<br>※散布工事使用時のみの販売                        |  |
| アップデート<br>第 24627 号           | イマザキン 19                  | イミダゾリノン系           | 1L×10              | 86,450           | 0.2 ～ 0.5ml     | 1.73～4.32   | 普        | ●         |     |     |     | ヒメクグ、ハマスゲ、チドメ                               |  |
| アルテミストフロアブル<br>第 23059 号      | アトラジン 43.9<br>メソトリオン 4.4  | トリアジン系<br>トリケトン系   | 500ml×10           | 92,400           | 0.06～0.2ml      | 1.11～3.70   | 普        | ●         | ●   |     |     | ウラジロチチコグサ<br>※散布工事使用時のみの販売                  |  |
| アルテミスト KAI フロアブル<br>第 24874 号 | アトラジン 43.9<br>メソトリオン 2.6  | トリアジン系<br>トリケトン系   | 500ml×10           | 104,000          | 0.06～0.2ml      | 1.25～4.16   | 普        | ●         | ●   |     |     | ウラジロチチコグサ<br>※散布工事使用時のみの販売                  |  |
| 一本締液剤<br>第 22169 号            | メコプロップPカリウム塩 52           | フェノキシ系             | 1L×10              | 68,930           | 0.2 ～ 0.5ml     | 1.38 ～ 3.45 |          | ●         |     | ●   |     | スギナ、チドメにも少量で高活性                             |  |
| MIC エンドタール K 液剤<br>第 23994 号  | エンドタールニカリウム塩 2.11         |                    | 2L×6               | 53,820           | 1～12ml          | 4.49～53.82  | 普        |           | ●   |     | ●   | スズメノカタビラ                                    |  |
| グラッチェ顆粒水和剤<br>第 20393 号       | エトキシスルフロン 60              | スルホニル尿素系           | 100g×6             | 75,900           | 0.015 ～ 0.075 g | 1.9 ～ 9.49  | 普        | ●         |     | ●   |     | ハマスゲ、ヒメクグ、チドメ、多年生カヤツリグサ<br>西洋芝にも安全、土壌兼茎葉処理剤 |  |
| グリーンアージラン液剤<br>第 22788 号      | アシュラム 37                  | 酸アミド系              | 1L×12<br>5L×4      | 48,720<br>81,200 | 0.4 ～ 1.25ml    | 1.62～5.08   | 普        | ●         | ●   |     | ●   |                                             |  |
| クロロ IPC 乳剤<br>第 7693 号        | IPC 45.8                  | カーバメート系            | 300ml×20           | 18,020           | 0.4 ～ 0.6ml     | 1.2 ～ 1.8   | 普        | ●         | ●   |     |     |                                             |  |
| ザイトロンアミン液剤<br>第 14673 号       | トリクロピル 44                 | フェノキシ系             | 1L×10              | 101,020          | 0.2 ～ 0.6ml     | 2.02 ～ 6.06 | 普        | ●         |     | ●   |     | クローバー、チドメグサ、クズ、キク科                          |  |
| シバゲン DF<br>第 22150 号          | フラザスルフロン 25               | スルホニル尿素系           | 100 g×3<br>20 g×15 | 55,500           | 0.01 ～ 0.04 g   | 1.85 ～ 7.4  | 普        | ●         | ●   | ●   |     | ハマスゲ、ヒメクグ、土壌兼茎葉処理剤                          |  |
| 芝用エコパート FL<br>第 22300 号       | ピラフルフェンエチル 2              | フェニルピラゾール系         | 500ml×4            | 31,200           | 0.1 ～ 0.6ml     | 1.56 ～ 9.36 | 普        | ●         | ●   | ●   |     | コケ類                                         |  |
| バンベル D 液剤<br>第 22303 号        | MDBAジメチルアミン 50            | 芳香族カルボン酸系          | 1L×10              | 148,000          | 0.1 ～ 0.2ml     | 1.48 ～ 2.96 | 普        | ●         |     | ●   |     | 牧草のギシギシ防除に卓効                                |  |
| ブロードスマッシュ SC<br>第 20315 号     | フロラスラム 4.5                | トリアゾロピリミジン系        | 250ml×12           | 135,240          | 0.02 ～ 0.08ml   | 0.9～3.61    | 普        | ●         |     | ●   |     | 西洋芝に安全                                      |  |
| モニュメント顆粒水和剤<br>第 21948 号      | トリフロキシスルフonatリウム塩 75      | スルホニルウレア系          | 7.5g×12            | 102,960          | 0.003 ～ 0.006 g | 3.43～6.86   | 普        | ●         | ●   | ●   | ●   | スズメノヒエ、チガヤ、ヒメクグ<br>※散布工事使用時のみの販売            |  |
| ワンサイド P 乳剤<br>第 20123 号       | フルアジホップP 17.5             | フェノキシ系             | 500ml×20           | 103,680          | 0.15ml          | 1.56        | 普        |           | ●   |     | ●   |                                             |  |
| 2,4-Dアミン塩<br>第 7698 号         | 2,4-PAジメチルアミン塩 49.5       | フェノキシ系             | 2L×10              | 60,360           | 1 ml            | 3.02        | 普        | ●         |     | ●   |     |                                             |  |

|                       |                     |       |                           |                            |            |                                     |   |   |   |   |   |  |  |        |
|-----------------------|---------------------|-------|---------------------------|----------------------------|------------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--------|
| エイトアップ液剤<br>第 18815 号 | グリホサートイソプロピルアミン塩 41 | アミノ酸系 | 500ml×20<br>1L×12<br>5L×3 | 29,200<br>34,620<br>42,825 | 0.25 ～ 2ml | 0.73～5.84<br>0.72～5.77<br>0.71～5.71 | 普 | ● | ● | ● | ● |  |  | 根まで枯らす |
| クサクリーン液剤<br>第 19929 号 | グリホサートイソプロピルアミン塩 41 | アミノ酸系 | 5L×4                      | 88,860                     | 0.25 ～ 2ml | 1.11～8.89                           | 普 | ● | ● | ● | ● |  |  | 根まで枯らす |

## 推奨殺菌剤

ゴルフ場管理資材のことなら 株式会社 マイスター

総合殺菌剤

**ガイア顆粒水和剤**

株式会社エムシー緑化

ローテーション散布に最適

**グリーンワークW P**

石原バイオサイエンス株式会社

葉枯病殺菌剤

**ツインサイドD F**

北興産業株式会社

チオファネートメチル、メトコナゾール殺菌剤

**トップバスター顆粒水和剤**

株式会社ニッソーグリーン

ダラースポット病に高い効果

**ディサイドフロアブル**

株式会社ニチノー緑化

ピシウム防除

**ランマンPフロアブル**

石原バイオサイエンス株式会社

# F U N G I C I D E

## 殺菌剤

| 商 品 名<br>農薬登録番号             | 主成分・含量（％）                        | 系 統 名                  | 規 格      | 価格(円)   | 薬 量 / ㎡        | 単 価 / ㎡ (円) | 人畜<br>毒性 | 希 釈 倍 率<br>水 量 / ㎡     | 適 用 病 害     |                   |                        |             |                        |             |                  |             |             |                   |                                                       |  |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|----------|---------|----------------|-------------|----------|------------------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--|
|                             |                                  |                        |          |         |                |             |          |                        | ダ<br>ラ<br>ー | ヘ<br>ル<br>ミ<br>ント | カ<br>イ<br>ブ<br>ラ<br>リア | 炭<br>疽<br>病 | テ<br>イ<br>ク<br>オ<br>イル | リ<br>ン<br>グ | ブ<br>ラ<br>ウ<br>ン | ラ<br>ー<br>ジ | 春<br>ハ<br>ゲ | ビ<br>シ<br>ウム<br>病 | そ の 他                                                 |  |
| アルテリア水和剤<br>第 24083 号       | フマル酸 80                          | (E)-2- ブテン二酸           | 500g×12  | 21,000  | 2～3g           | 7.0～10.5    | 普        | 250～500 倍<br>0.5～1L    |             |                   |                        |             |                        |             |                  |             |             |                   | かさ枯病、藻類                                               |  |
| イカルガ 35SC<br>第 20585 号      | チフルザミド 35                        | カルボキシアミド剤              | 500ml×10 | 110,270 | 0.15～0.3ml     | 3.31～6.62   | 普        | 1000～4000 倍<br>0.3～1L  |             |                   |                        |             |                        | ●           | ●                | ●           | ●           |                   | 雪腐小粒菌核病                                               |  |
| オーソサイド水和剤 80<br>第 21292 号   | キャプタン 80                         | フタルイミド系                | 1kg×10   | 34,550  | 1～6.72g        | 3.46～23.22  | 普        | 300～800 倍<br>1～2L      |             |                   |                        |             |                        |             | ●                |             |             |                   | 赤焼病                                                   |  |
| ガイア顆粒水和剤<br>第 22211 号       | ペンチオピラド 50                       | SDHI                   | 250g×6   | 81,000  | 0.125～0.25g    | 6.75～13.50  | 普        | 400～2000 倍<br>0.1～0.5L | ●           |                   | ●                      | ●           |                        | ●           | ●                | ●           | ●           |                   | 雪腐小粒菌核病                                               |  |
| クインテクト顆粒水和剤<br>第 23894 号    | ピカルブトラゾクス 20                     | テトラゾリルオキシム系            | 500g×4   | 62,800  | 0.25～0.5g      | 7.85～15.7   | 普        | 200～2000 倍<br>0.1～0.5L |             |                   |                        |             |                        |             |                  |             |             | ●                 | 赤焼病                                                   |  |
| グラステン水和剤<br>第 15940 号       | イソプロチオラン<br>フルトラニル 20<br>25      | ジオチラン類<br>酸アミド系        | 1kg×10   | 75,200  | 2～3.3g         | 15.4～24.82  | 普        | 100～600 倍<br>0.2～10L   |             | ●                 | ●                      |             |                        | ●           | ●                | ●           | ●           |                   | 紅色雪腐病、さび病、雪腐小粒菌核病、<br>いもち病                            |  |
| グラステン粒剤<br>第 17008 号        | イソプロチオラン<br>フルトラニル 4<br>5        | ジオチラン類<br>酸アミド系        | 10kg×1   | 13,500  | 15～60g         | 20.25～81    | 普        |                        |             |                   |                        |             |                        | ●           |                  | ●           |             |                   | 雪腐小粒菌核病、紅色雪腐病                                         |  |
| グランサー水和剤<br>第 15761 号       | トルクロホスメチル 75                     | 有機リン系                  | 1kg×10   | 106,700 | 0.7～2g         | 7.47～21.34  | 普        | 200～1000 倍<br>0.2～1L   |             |                   |                        |             |                        |             |                  | ●           | ●           |                   | イエローパッチ、象の足跡、<br>雪腐小粒菌核病                              |  |
| グリーンワーク WP<br>第 22825 号     | シアゾファミド 20<br>ポリオキシシD亜鉛塩 9       | シアゾイミダゾール系<br>抗生物質     | 250g×8   | 68,800  | 0.25g          | 8.6         | 普        | 400～2000 倍<br>0.1～2.5L |             |                   |                        | ●           |                        |             | ●                |             |             | ●                 | 赤焼病                                                   |  |
| クロステクト水和剤<br>第 23529 号      | マンゼブ 65<br>ミクロブタニル 2             | ジチオカーバメート系<br>EBI 剤    | 1kg×10   | 34,000  | 1～3g           | 3.4～10.2    | 普        | 125～250 倍<br>0.25～0.5L | ●           |                   | ●                      | ●           |                        |             |                  |             |             | ●                 | 藻類発生初期                                                |  |
| コレカムロアブル<br>第 24935 号       | イミノクタジンアルベシル酸塩 30                | グアニジン系                 | 500ml×10 | 42,000  | 0.25～0.5ml     | 2.1～4.2     | 普        | 1000～2000 倍<br>0.5L    | ●           |                   |                        | ●           |                        |             |                  |             |             |                   |                                                       |  |
| サンブレイク液剤<br>第 22170 号       | ヒドロキシイソキサゾール16.5                 | イソキサゾール系               | 500ml×20 | 67,800  | 1～2ml          | 6.78～13.56  | 普        | 50～500 倍<br>0.1～0.5L   |             |                   |                        |             |                        |             |                  |             |             | ●                 | 赤焼病                                                   |  |
| シバンバ PRO フロアブル<br>第 24180 号 | アゾキシストロビン 18<br>ヘキサコナゾール 15.3    | ストロビルリン系<br>EBI 剤      | 1L×10    | 98,000  | 0.4ml<br>(推奨)  | 3.92        | 普        | 250~666 倍<br>0.1～0.2L  | ●           |                   | ●                      |             |                        |             |                  | ●           | ●           |                   | 立枯病、ネクロティックリングスポット、象の足跡<br>※適用は日本芝のみ<br>※散布工事使用時のみの販売 |  |
| シバンバフロアブル<br>第 21507 号      | アゾキシストロビン 18.2<br>シプロコナゾール 7.3   | ストロビルリン系<br>EBI 剤      | 500ml×10 | 72,420  | 0.25ml<br>(推奨) | 3.62        | 普        | 666~1000 倍<br>0.2L     | ●           |                   |                        |             |                        |             |                  | ●           | ●           |                   | ※適用は日本芝のみ<br>※散布工事使用時のみの販売                            |  |
| セレンターフ顆粒水和剤<br>第 20068 号    | ペンシクロン 50                        | フェニルウレア系               | 1kg×10   | 80,700  | 0.5g           | 4.04        | 普        | 1000 倍<br>0.5L         |             |                   |                        |             |                        |             |                  | ●           |             |                   |                                                       |  |
| ターフトップDF<br>第 20135 号       | クレソキシムメチル 40                     | ストロビルリン系               | 500g×10  | 75,600  | 0.2～1g         | 3.02～15.12  | 普        | 1000 倍<br>0.2～1L       |             | ●                 | ●                      | ●           | ●                      | ●           | ●                | ●           | ●           | ●                 | さび病、雪腐小粒菌核病、象の足跡、<br>イエローパッチ                          |  |
| ダイブフロアブル<br>第 21506 号       | アゾキシストロビン 18.2<br>ジフェノコナゾール 11.3 | ストロビルリン系<br>トリアゾール系    | 500ml×4  | 67,200  | 0.3～0.5ml      | 10.08～16.8  | 普        | 167～2000 倍<br>0.05～1L  | ●           |                   |                        | ●           |                        | ●           | ●                |             |             | ●                 | 雪腐小粒菌核病、紅色雪腐病<br>※散布工事使用時のみの販売                        |  |
| ダコグリーン顆粒水和剤<br>第 23062 号    | チウラム 30<br>TPN 50                | ジチオカーバメート系<br>クロロニトリル系 | 1kg×10   | 38,500  | 2～4g           | 7.7～15.4    | 普        | 500 倍<br>1～2L          |             | ●                 |                        |             |                        |             | ●                |             |             |                   |                                                       |  |

| 商 品 名<br>農薬登録番号           | 主成分・含量（％）                  | 系 統 名                    | 規 格      | 価格(円)   | 薬 量 / ㎡       | 単 価 / ㎡ (円)   | 人畜<br>毒 性 | 希 釈 倍 率<br>水 量 / ㎡          | 適 用 病 害     |                   |                            |             |                        |             |                  |             |             |                   |       |                                           |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------|----------|---------|---------------|---------------|-----------|-----------------------------|-------------|-------------------|----------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------|-------------------------------------------|
|                           |                            |                          |          |         |               |               |           |                             | ダ<br>ラ<br>ー | ヘ<br>ル<br>ミ<br>ント | カ<br>イ<br>フ<br>ラ<br>リ<br>ア | 炭<br>疽<br>病 | テ<br>イ<br>ク<br>オ<br>イル | リ<br>ン<br>グ | ブ<br>ラ<br>ウ<br>ン | ラ<br>ー<br>ジ | 春<br>ハ<br>ゲ | ビ<br>シ<br>ウム<br>病 | そ の 他 |                                           |
| タチガレン液剤<br>第 10331 号      | ヒドロキシイソキサゾール 30            | イソキサゾール系                 | 500ml×20 | 83,200  | 2 ～ 4ml       | 16.64 ～ 33.28 | 普         | 500 ～ 1000 倍<br>2L          |             |                   |                            |             |                        |             |                  |             |             |                   |       | 赤焼病                                       |
| タフシーバフロアブル<br>第 19577 号   | ペンシクロン 15<br>テブコナゾール 10    | フェニルウレア系<br>EBI 剤        | 1L×12    | 99,600  | 1ml           | 8.3           | 普         | 500 ～ 1000 倍<br>0.5 ～ 1L    | ●           | ●                 | ●                          | ●           |                        | ●           | ●                | ●           | ●           |                   |       |                                           |
| ツインサイドDF<br>第 21279 号     | イミベンコナゾール 30               | EBI 剤                    | 200g×6   | 39,660  | 0.04 ～ 0.2g   | 1.32 ～ 6.61   | 普         | 2500 ～ 5000 倍<br>0.2 ～ 0.5L | ●           | ●                 | ●                          |             |                        |             |                  |             |             |                   |       |                                           |
| ディサイドフロアブル<br>第 24005 号   | ピラジフルミド 20                 | SDHI                     | 500ml×4  | 76,000  | 0.13 ～ 0.25ml | 4.94 ～ 9.5    | 普         | 200 ～ 2000 倍<br>0.05 ～ 0.5L | ●           |                   | ●                          | ●           |                        |             | ●                |             | ●           |                   |       | イエローパッチ、象の足跡、<br>ネクロティックリングスポット、ドレクスレラ葉枯病 |
| ドウグリン水和剤<br>第 17832 号     | 8-ヒドロキシキノリン 80             | 有機銅剤                     | 1kg×10   | 73,340  | 1.6 ～ 4g      | 11.73 ～ 29.34 | 普         | 250 ～ 500 倍<br>1L           |             | ●                 | ●                          |             | ●                      |             | ●                |             |             |                   |       | 紅色雪腐病、かさ枯病、褐条病、<br>雪腐小粒菌核病、藻類             |
| トップグラス顆粒水和剤<br>第 24844 号  | チオファネートメチル 70              | ベンゾイミダゾール系               | 1kg×10   | 65,760  | 0.5 ～ 1g      | 3.29 ～ 6.58   | 普         | 500 ～ 1500 倍<br>0.5 ～ 1L    | ●           | ●                 | ●                          | ●           | ●                      |             | ●                | ●           | ●           |                   |       | イエローパッチ、象の足跡                              |
| トップバスター顆粒水和剤<br>第 22041 号 | チオファネートメチル 35<br>メトコナゾール 5 | ベンゾイミダゾール系<br>トリアゾール系    | 1kg×10   | 69,000  | 0.5 ～ 1g      | 3.45 ～ 6.9    | 普         | 500 ～ 1000 倍<br>0.25 ～ 0.5L | ●           |                   | ●                          | ●           |                        | ●           | ●                | ●           | ●           |                   |       | 雪腐小粒菌核病、紅色雪腐病、                            |
| パッチコロン水和剤<br>第 20695 号    | シメコナゾール 20                 | EBI 剤                    | 250g×20  | 118,400 | 0.125 ～ 0.25g | 2.96 ～ 5.92   | 普         | 800 ～ 4000 倍<br>0.2 ～ 0.5L  | ●           |                   | ●                          | ●           |                        |             | ●                | ●           | ●           |                   |       |                                           |
| バリダシン液剤5<br>第 17386 号     | バリダマイシンA 5                 | 抗生物質                     | 1L×10    | 43,800  | 1 ～ 2ml       | 4.38 ～ 8.76   | 普         | 500 ～ 1000 倍<br>0.5 ～ 1L    |             |                   |                            |             |                        |             | ●                | ●           |             |                   |       |                                           |
| ピュアスター FL<br>第 24790 号    | メチルテトラプロール 9.7             | ストロビルリン系                 | 1L×6     | 102,000 | 0.5ml         | 8.5           | 普         | 200 ～ 1000 倍<br>0.1 ～ 0.5L  |             |                   |                            | ●           |                        |             |                  |             |             |                   |       |                                           |
| プレビクールN液剤<br>第 17197 号    | プロパモカルブ塩酸塩 64              | カーバメート系                  | 1L×10    | 100,000 | 1 ～ 2.5ml     | 10 ～ 25       | 普         | 400 ～ 600 倍<br>0.5 ～ 1L     |             |                   |                            |             |                        |             |                  |             |             | ●                 |       | 赤焼病                                       |
| ベンレートT水和剤 20<br>第 20888 号 | チウラム 20<br>ベノミル 20         | ジチオカーバメート系<br>ベンゾイミダゾール系 | 1kg×12   | 84,500  | 1 ～ 2g        | 7.04 ～ 14.08  | 普         | 1000 倍<br>1 ～ 2L            |             | ●                 |                            |             |                        |             | ●                | ●           |             |                   |       |                                           |
| ポリオキシシンZ水和剤<br>第 15504 号  | ポリオキシシンD亜鉛塩 2.25           | 抗生物質                     | 1kg×10   | 48,300  | 1 ～ 40g       | 4.83～193.2    | 普         | 250 ～ 1000 倍<br>1 ～ 10L     |             | ●                 | ●                          |             |                        | ●           | ●                | ●           | ●           |                   |       |                                           |
| ポリオキシシンZ DF<br>第 19684 号  | ポリオキシシンD亜鉛塩 11.3           | 抗生物質                     | 500g×8   | 89,680  | 0.125 ～ 8g    | 2.8～179.36    | 普         | 250 ～ 2000 倍<br>0.25 ～ 2L   |             | ●                 | ●                          | ●           |                        | ●           | ●                | ●           | ●           |                   |       | 象の足跡                                      |
| ボンジョルノ乳剤<br>第 20020 号     | テトラコナゾール 25                | EBI 剤                    | 250ml×4  | 62,100  | 0.125 ～ 0.5ml | 7.76 ～ 31.05  | 普         | 400 ～ 2000 倍<br>0.05 ～ 1L   | ●           | ●                 | ●                          | ●           | ●                      |             |                  |             |             |                   |       |                                           |
| マックスティーマFL<br>第 24933 号   | メフェントリフルコナゾール 34.9         | トリアゾール系                  | 500ml×10 | 85,000  | 0.5ml         | 8.5           | 普         | 200 ～ 1000 倍<br>0.1 ～ 0.5L  | ●           |                   | ●                          | ●           |                        | ●           | ●                |             |             |                   |       |                                           |
| マネージ乳剤<br>第 18686 号       | イミベンコナゾール 5                | EBI 剤                    | 1L×10    | 63,800  | 0.2 ～ 1ml     | 1.28 ～ 6.38   | 普         | 500 ～ 1000 倍<br>0.2 ～ 1L    | ●           | ●                 | ●                          |             |                        |             |                  |             |             |                   |       | さび病                                       |
| ランマンPフロアブル<br>第 22113 号   | シアゾファミド 9.4                | シアノイミダゾール系               | 1L×5     | 60,500  | 0.5ml         | 6.05          | 普         | 1000 倍<br>0.5L              |             |                   |                            |             |                        |             |                  |             |             | ●                 |       | 赤焼病                                       |

## 推奨殺虫剤

ゴルフ場管理資材のことなら 株式会社 マイスター

松枯れ防止樹幹注入剤

**マツガード**

株式会社エムシー緑化

速やかに摂食行動を阻害

**スティンガーフロアブル**

株式会社ニチノー緑化

コガネムシとチョウ目の同時防除

**タフスティンガーフロアブル**

株式会社ニチノー緑化

既存剤に抵抗性を持つ害虫にも高い効果

**テラフロアブル**

株式会社エムシー緑化

チョウ目からコガネムシ幼虫まで

**ナイスイーグルSC**

石原バイオサイエンス株式会社

# INSECTI CIDE

## 殺虫剤

| 商 品 名<br>農業登録番号            | 主成分・含量（％）                  | 系 統 名              | 規 格      | 価 格（円）  | 薬 量 / ㎡         | 単 価 / ㎡（円）   | 人畜<br>毒性 | 希 釈 倍 率<br>水 量 / ㎡            | 適 用 害 虫 |         |       |       |        |     |  | そ の 他                          |
|----------------------------|----------------------------|--------------------|----------|---------|-----------------|--------------|----------|-------------------------------|---------|---------|-------|-------|--------|-----|--|--------------------------------|
|                            |                            |                    |          |         |                 |              |          |                               | シバツトガ   | スズキリヨトウ | タマナヤガ | コガネムシ | シオサシムシ | ミミズ |  |                                |
| オルトラン水和剤<br>第 13175 号      | アセフェート 50                  | 有機リン系              | 500g×20  | 84,000  | 0.25 ～ 2g       | 2.16 ～ 17.25 | 普        | 1000 倍<br>0.25 ～ 2L           | ●       | ●       | ●     |       | ●      |     |  | アカフツツリガ、ケラ                     |
| オルトラン粒剤<br>第 13177 号       | アセフェート 5                   | 有機リン系              | 3kg×8    | 27,240  | 5 ～ 10g         | 5.68 ～ 11.35 | 普        |                               | ●       | ●       | ●     |       |        |     |  |                                |
| ガードワン水和剤<br>第 19133 号      | テブフェノジド 40                 | I G R              | 250g×10  | 74,000  | 0.075g          | 2.22         | 普        | 4000 倍<br>0.3L                | ●       | ●       | ●     |       |        |     |  |                                |
| ガゼット粒剤<br>第 21046 号        | カルボスルファン 3                 | カーバメート系            | 3kg×8    | 31,440  | 5 ～ 10g         | 6.54 ～ 13.08 | 劇        |                               |         |         |       | ●     | ●      |     |  |                                |
| グレモ S C<br>第 22864 号       | メトキシフェノジド 20               | I G R              | 250ml×8  | 59,920  | 0.1ml           | 3            | 普        | 3000 ～ 4000 倍<br>0.2 ～ 0.8L   | ●       | ●       | ●     |       |        |     |  |                                |
| サニーフィールド M C<br>第 23330 号  | エトフェンプロックス 20              | ピレスロイド系            | 500ml×20 | 96,000  | 0.15 ～ 0.5ml    | 1.44 ～ 4.8   | 普        | 2000 倍<br>0.3 ～ 1L            | ●       | ●       |       |       |        |     |  | ケラ                             |
| スカウトフロアブル<br>第 17253 号     | トラロメトリン 1.4                | ピレスロイド系            | 500ml×20 | 135,600 | 0.13 ～ 0.2ml    | 1.76 ～ 2.71  | 劇        | 1500 倍<br>0.2 ～ 0.3L          | ●       | ●       |       |       |        |     |  |                                |
| スティンガーフロアブル<br>第 22269 号   | フルベンジアミド 42                | ジアミド系              | 250ml×4  | 68,000  | 0.05ml          | 3.4          | 普        | 4000 倍<br>0.2L                | ●       | ●       | ●     |       |        |     |  | ケムシ類                           |
| スミチオン乳剤<br>第 4991 号        | M E P 50                   | 有機リン系              | 500ml×20 | 46,000  | 0.3～3ml         | 1.38～13.8    | 普        | 1000 倍<br>0.3～3L              | ●       | ●       |       | ●     | ●      |     |  |                                |
| ダイアジノン S L ゾル<br>第 17620 号 | ダイアジノン 25                  | 有機リン系              | 1L×15    | 61,500  | 0.3 ～ 4ml       | 1.23 ～ 16.4  | 普        | 250 ～ 1000 倍<br>0.3 ～ 1L      | ●       | ●       |       | ●     | ●      |     |  |                                |
| タフスティンガーフロアブル<br>第 23016 号 | イミダクロプリド 25<br>フルベンジアミド 15 | ネオニコチノイド系<br>ジアミド系 | 500ml×2  | 58,000  | 0.1ml           | 5.8          | 劇        | 2000 倍<br>0.2L                | ●       | ●       | ●     | ●     | ●      |     |  | チガヤシロオカイガラムシ幼虫                 |
| タフバリアフロアブル<br>第 20664 号    | イミダクロプリド 20                | ネオニコチノイド系          | 400ml×10 | 94,000  | 0.2ml           | 4.7          | 劇        | 500 ～ 2500 倍<br>0.1 ～ 0.5L    |         |         |       | ●     | ●      |     |  | チガヤシロオカイガラムシ幼虫、ケラ初期            |
| ダブルトリガー液剤<br>第 24187 号     | シクラニプロール 5                 | ジアミド系              | 500ml×8  | 50,800  | 0.2 ～ 0.4ml     | 2.54 ～ 5.08  | 普        | 250 ～ 1500 倍<br>0.3 ～ 3L      | ●       | ●       | ●     | ●     | ●      |     |  | ケラ、ケムシ（樹木類）                    |
| テラフロアブル<br>第 24591 号       | プロフラニリド 20                 | メタジアミド系            | 125ml×4  | 58,000  | 0.025 ～ 0.125ml | 2.9 ～ 14.5   | 普        | 1000 ～ 20000 倍<br>0.05 ～ 0.5L | ●       | ●       | ●     | ●     | ●      |     |  | 樹木：ケムシは 16000 倍 200 ～ 700L/10a |
| トアローフロアブル C T<br>第 20056 号 | B T 7                      | BT 剤               | 500ml×20 | 125,780 | 0.3 ～ 0.6ml     | 3.77 ～ 7.55  | 普        | 500 ～ 1000 倍<br>0.3L          | ●       | ●       |       |       |        |     |  |                                |
| ナイスイーグル S C<br>第 23080 号   | クロルフルアズロン 10               | ベンゾイル尿素系           | 250ml×10 | 43,500  | 0.075 ～ 0.25ml  | 1.31 ～ 4.35  | 普        | 2000 ～ 4000 倍<br>0.3 ～ 1L     | ●       |         | ●     | ●     |        |     |  |                                |
| フルスウィング<br>第 20733 号       | クロチアニジン 50                 | ネオニコチノイド系          | 100g×20  | 75,600  | 0.1 ～ 0.2g      | 3.78 ～ 7.56  | 普        | 1000 ～ 5000 倍<br>0.1 ～ 1L     | ●       | ●       | ●     | ●     | ●      |     |  |                                |
| リラーク D F<br>第 23135 号      | チオジカルブ 80                  | カーバメート系            | 500g×10  | 58,600  | 0.1 ～ 1g        | 1.17 ～ 11.72 | 劇        | 500 ～ 2000 倍<br>0.25 ～ 3L     | ●       | ●       | ●     | ●     | ●      | ●   |  |                                |

| 商 品 名<br>農薬登録番号         | 主成分・含量（％）  | 系 統 名     | 規 格            | 価格(円)            |  | 人畜<br>毒性 | 希 釈 倍 率       | 備 考              |
|-------------------------|------------|-----------|----------------|------------------|--|----------|---------------|------------------|
| ウッドスター<br>第 23624 号     | ジノテフラン 8   | ネオニコチノイド系 | 450ml×2        | 79,200           |  | 普        |               | ケムシ、吸汁性害虫（樹幹注入剤） |
| スミパイン乳剤<br>第 15044 号    | MEP 80     | 有機リン系     | 10L            | 70,600           |  | 普        | 150 ～ 200 倍   | マツクイムシ           |
| マツグリーン液剤<br>第 20330 号   | アセタミプリド 20 | ネオニコチノイド系 | 1L×4           | 134,000          |  | 劇        | 1000 ～ 2500 倍 | マツクイムシ           |
| マツグリーン液剤 2<br>第 20838 号 | アセタミプリド 2  | ネオニコチノイド系 | 10L×1<br>1L×12 | 33,500<br>40,200 |  | 普        | 10 ～ 100 倍    | マツクイムシ           |

|                    |           |         |                     |                    |  |   | 効 果  |                     |
|--------------------|-----------|---------|---------------------|--------------------|--|---|------|---------------------|
| マツガード<br>第 20403 号 | ミルベメクチン 2 | マクロライド系 | 60ml×80<br>180ml×40 | 200,000<br>300,000 |  | 普 | 殺線虫剤 | マツノザイセンチュウ 有効年数 6 年 |

|                           |                  |           |                  |                   |  |   | 薬 量 / ㎡       |                            |
|---------------------------|------------------|-----------|------------------|-------------------|--|---|---------------|----------------------------|
| グリーンフィールド水和剤<br>第 17317 号 | フルルプリミドール 50     |           | 500g×4<br>50g×20 | 178,000<br>92,000 |  | 普 | 0.2 ～ 0.4g    | 土壌兼茎葉処理剤 刈込軽減 多剤との混合散布が効果的 |
| グリーンフィールド粒剤<br>第 17622 号  | フルルプリミドール 1      |           | 5kg×2            | 33,000            |  | 普 | 5 ～ 20g       | 土壌兼茎葉処理剤 刈込軽減 多剤との混合散布が効果的 |
| ナイン G 乳剤<br>第 23085 号     | ニコスルフロン 4        | スルホニルウレア系 | 250ml×10         | 55,000            |  | 普 | 0.1 ～ 0.15ml  | 多年生イネ科雑草の刈込軽減 チガヤ対策に       |
| プリモマックス液剤<br>第 21959 号    | トリネキサパックエチル 11.2 |           | 250ml×4          | 65,000            |  | 普 | 0.035 ～ 0.2ml | 芽数増加、根量増加<br>※散布工事使用時のみの販売 |

| 商 品 名                                                         |                    | 用 途 等  | 規 格 | 価 格 (円) | 備 考                   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----|---------|-----------------------|
| ク<br>リ<br>ー<br>ピ<br>ン<br>グ<br>ベ<br>ン<br>ト<br>グ<br>ラ<br>ス      | サムライ               | グリーン   | 1kg | 18,500  | 8~12g/m <sup>2</sup>  |
|                                                               | シーサイド 2            | グリーン   | 1kg | 13,800  | 5~16g/m <sup>2</sup>  |
|                                                               | Super7(スーパーセブン)    | グリーン   | 1kg | 18,500  | 8~12g/m <sup>2</sup>  |
|                                                               | 007 (ダブルオーセブン)     | グリーン   | 1kg | 18,500  | 8~12g/m <sup>2</sup>  |
|                                                               | 007XL (ダブルオーセブンXL) | グリーン   | 1kg | 18,500  | 8~12g/m <sup>2</sup>  |
|                                                               | ドミネントNEO           | グリーン   | 1kg | 12,400  | 10~15g/m <sup>2</sup> |
|                                                               | 777 (トリプルセブン)      | グリーン   | 1kg | 18,500  | 8~12g/m <sup>2</sup>  |
| ク<br>リ<br>ー<br>ピ<br>ン<br>グ<br>レ<br>ッ<br>ド<br>フ<br>ェ<br>ス<br>ク | ナイトライフ             | グリーン   | 1kg | 22,900  | 5~16g/m <sup>2</sup>  |
|                                                               | クリーピングレッドフェスク      | FW・TEE | 1kg | 3,860   | 15~20g/m <sup>2</sup> |
|                                                               | ルディ                | FW・TEE | 1kg | 2,500   | 20~30g/m <sup>2</sup> |
| ト<br>ー<br>ル<br>フ<br>ェ<br>ス<br>ク                               | マーベル               | FW・TEE | 1kg | 4,580   | 15~20g/m <sup>2</sup> |
|                                                               | トールフェスク            | FW・TEE | 1kg | 2,820   | 15~20g/m <sup>2</sup> |
|                                                               | バーバリアン             | FW・TEE | 1kg | 3,920   | 15~20g/m <sup>2</sup> |
|                                                               | ファイヤーウォール          | FW・TEE | 1kg | 2,300   | 20~30g/m <sup>2</sup> |
|                                                               | タイタニウム 2 LS        | FW・TEE | 1kg | 4,250   | 20~30g/m <sup>2</sup> |
|                                                               | レースウェイ             | FW・TEE | 1kg | 2,300   | 20~30g/m <sup>2</sup> |

● 改造工事、設計見積もり致します。

| 商 品 名                                     |                 | 用 途 等    | 規 格 | 価 格 (円) | 備 考                    |
|-------------------------------------------|-----------------|----------|-----|---------|------------------------|
| チ<br>ュ<br>ー<br>ン<br>グ<br>フ<br>ェ<br>ス<br>ク | コンパス 2          | FW・TEE   | 1kg | 4,820   | 15~20g/m <sup>2</sup>  |
|                                           | シルエット           | FW・TEE   | 1kg | 2,500   | 20~30g/m <sup>2</sup>  |
| ハ<br>ー<br>ド<br>フ<br>ェ<br>ス<br>ク           | ハードフェスク         | FW・TEE   | 1kg | 5,490   |                        |
|                                           | ミニマス            | FW・TEE   | 1kg | 5,490   |                        |
| ラ<br>イ<br>グ<br>ラ<br>ス                     | ペレニアルライグラス      | FW・TEE   | 1kg | 3,070   | 15~20g/m <sup>2</sup>  |
|                                           | トランスAZ          | FW・TEE   | 1kg | 1,800   | 30~100g/m <sup>2</sup> |
|                                           | アスパイヤー          | FW・TEE   | 1kg | 3,930   | 30~80g/m <sup>2</sup>  |
|                                           | サイドウェイ          | FW・TEE   | 1kg | 2,200   | 30~50g/m <sup>2</sup>  |
|                                           | SR4660          | FW・TEE   | 1kg | 2,500   | 30~100g/m <sup>2</sup> |
|                                           | スラッガー3GL        | FW・TEE   | 1kg | 3,930   | 30~60g/m <sup>2</sup>  |
|                                           | ファイヤーボール        | WOS 専用   | 1kg | 3,930   | 10~80g/m <sup>2</sup>  |
| バ<br>ミ<br>ュ<br>ー<br>ダ<br>グ<br>ラ<br>ス      | イタリアン ライグラス ガルフ |          | 1kg | 1,730   | 20~40g/m <sup>2</sup>  |
|                                           | バミューダグラス        |          | 1kg | 11,980  | 10~20g/m <sup>2</sup>  |
|                                           | ミラージュ 2 (皮とり)   |          | 1kg | 21,200  | 10~20g/m <sup>2</sup>  |
|                                           | ミラージュ 2 (皮付)    |          | 1kg | 12,000  | 10~20g/m <sup>2</sup>  |
|                                           | ロイヤルベンガル        |          | 1kg | 15,000  | 5~10g/m <sup>2</sup>   |
|                                           | ユーコン            | 寒地型バミューダ | 1kg | 15,000  | 5~10g/m <sup>2</sup>   |

| 商 品 名        |                            | 用 途 等  | 規 格 | 価格(円)   | 備 考       |
|--------------|----------------------------|--------|-----|---------|-----------|
| ケンタッキーブルーグラス | ケンタッキーブルーグラス               | FW・TEE | 1kg | 4,250   | 10～15g/㎡  |
|              | ジャックラビット                   | FW・TEE | 1kg | 3,200   | 10～50 g/㎡ |
|              | エストレラ                      | FW・TEE | 1kg | 2,700   | 20～40g/㎡  |
|              | グラネット                      | FW・TEE | 1kg | 3,400   | 20～40g/㎡  |
|              | シャノン                       | FW・TEE | 1kg | 3,400   | 20～40g/㎡  |
|              | SPF-30                     | FW・TEE | 1kg | 3,600   | 20～40g/㎡  |
|              | バーセラティ                     | FW・TEE | 1kg | 5,830   | 20～40g/㎡  |
|              | ブルーノート                     | FW・TEE | 1kg | 5,830   | 20～40g/㎡  |
|              | プラフィン                      | FW・TEE | 1kg | 5,830   | 20～40g/㎡  |
| ハイランドハイムガーデン | チャンピオンドwarf<br>ネット芝(ゴーローン) | グリーン   | 1㎡  | ご相談ください |           |
|              | チャンピオンドwarf<br>ほぐし芝        | グリーン   | 1㎡  | ご相談ください |           |

● 洋芝・野芝・高麗芝ソッドも取り扱っております。

| 商 品 名      | 用 途 等   | 規 格              | 価 格 (円)    | 備 考                                                                                    |
|------------|---------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ネトロンパイプ    | 暗渠資材    | 各種               | ご相談<br>下さい | ネトロンパイプPDS (円周上30%の無孔部)<br>ネトロンパイプPCS (全面開孔)<br>ネオドレンSC (全面開孔)<br>ネオドレンSD (円周上30%の無孔部) |
| トリカルネット    | 暗渠資材    | 各種               | ご相談<br>下さい | トリカルネット N-3 (1 × 50m)<br>トリカルパイプ P-66<br>トリカルパイプ P-76<br>トリカルパイプ P-101                 |
| トヨドレン      | 暗渠資材    | 各種               | ご相談<br>下さい | トヨドレン ダブル管 TDW 部品<br>トヨドレン シングル管 TD S 部品                                               |
| トスコ・サンアルミ  | グリーンカバー | 1 m <sup>2</sup> | ご相談<br>下さい | アルミ蒸着加工・軽量で特殊ポリエチレンを<br>ベースにした織布なので、強度が高い<br>(タテ・ヨコ補強糸入り)                              |
| バンカードレーン   |         | 1セット             | ご相談<br>下さい | バンカー配水資材                                                                               |
| モグラキャッチ    | モグラ捕獲器  | 片面               | ご相談<br>下さい | みみず臭付きモグラ捕獲器                                                                           |
| スプリンクラー    |         | 各種               | ご相談<br>下さい | TORO new 800シリーズ<br>レインバード、部品等                                                         |
| グリーンキープファン |         | 各種               | ご相談<br>下さい | 固定式、移動式、昇降式<br>夏場のムレ対策、凍霜害対策、<br>グリーンの健全育成に                                            |
| 砂          |         | 各種               | ご相談<br>下さい | 高萩産バンカー砂、目土砂                                                                           |
| 気象関係       |         | 各種               | ご相談<br>下さい | 温度計、湿度計、Phメーター、各種用紙                                                                    |
| プラ擬木       |         | 各種               | ご相談<br>下さい | 杭、標識、藤棚、池用杭等                                                                           |

● その他各種ゴルフ場用品を取り扱っております。お気軽にお問い合わせ下さい。

| 種 目                     | 備 考       |
|-------------------------|-----------|
| コース管理コンサルタント            |           |
| コース管理作業請負               |           |
| 除草剤散布作業                 |           |
| 松喰虫防除地上散布作業             |           |
| マツノザイセンチュウ防除樹幹注入剤打ち込み作業 |           |
| 暗渠排水工事                  |           |
| 獣害対策用フェンス工事             | イノシシ用、シカ用 |
| スプリンクラー設計・工事            |           |
| 各種更新作業                  |           |
| 水質検査                    |           |
| 土壌分析・葉身分析               |           |

●お気軽にご相談ください。



進入防止用フェンス、電気柵等、各種取り扱っております。  
設置作業につきましても、お気軽にご相談ください。

お問い合わせは

株式会社 マイスター

〒350-0225 埼玉県坂戸市日の出町2-2 ときわビル5F  
TEL 049-237-6220 FAX 049-237-7378  
www.k-meister.com

ゴルフ場用品のことは  
お任せください。



あなたのゴルフ場に眠っている  
中古機械、買い取ります！

(株)マイスターの姉妹会社

**KRAFT 株式会社クラフト**

埼玉県公安委員会古物商許可 第 431330029107 号

〒350-0225 埼玉県坂戸市日の出町 2-2 ときわビル 5F  
TEL 049-237-6223

## 薬量と散布面積

| ㎡当り使用量     | 水 1000L 当り薬量 (ml)<br>200ml/㎡ → 5000㎡散布 |
|------------|----------------------------------------|
| 0.003 g/㎡  | 15                                     |
| 0.005 g/㎡  | 25                                     |
| 0.0075 g/㎡ | 37.5                                   |
| 0.01 g/㎡   | 50                                     |
| 0.02 g/㎡   | 100                                    |
| 0.03 g/㎡   | 150                                    |
| 0.04 g/㎡   | 200                                    |
| 0.045 g/㎡  | 225                                    |
| 0.05 g/㎡   | 250                                    |
| 0.06 g/㎡   | 300                                    |
| 0.07 g/㎡   | 350                                    |
| 0.075 g/㎡  | 375                                    |
| 0.1 g/㎡    | 500                                    |
| 0.2 g/㎡    | 1,000                                  |
| 0.3 g/㎡    | 1,500                                  |
| 0.4 g/㎡    | 2,000                                  |
| 0.5 g/㎡    | 2,500                                  |

## 希釈倍率表

| 希釈倍数    | 水 1000L 当り薬量 (ml) |
|---------|-------------------|
| 5,000 倍 | 200               |
| 4,000 倍 | 250               |
| 3,000 倍 | 330               |
| 2,500 倍 | 400               |
| 2,000 倍 | 500               |
| 1,500 倍 | 660               |
| 1,000 倍 | 1,000             |
| 800 倍   | 1,250             |
| 600 倍   | 1,660             |
| 500 倍   | 2,000             |
| 450 倍   | 2,220             |
| 400 倍   | 2,500             |
| 300 倍   | 3,350             |
| 250 倍   | 4,000             |
| 200 倍   | 5,000             |
| 125 倍   | 8,000             |
| 100 倍   | 10,000            |

薬量と散布面積

希釈倍率表